

INSTRUÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO PALIVIZUMABE - PÓ LIOFILIZADO (PÓ + SOLVENTE)

Apresentação de 100 mg:

1. Para reconstituir: remover o lacre do frasco e limpar a tampa de borracha com álcool a 70% ou equivalente.

2. Adicionar lentamente 1,0 ml de água para injetáveis ao frasco, Homogeneizar a solução lentamente com o frasco **levemente** inclinado, para evitar formação de espuma, com movimentos rotatórios por 30 segundos.



Não agitar o frasco-ampola.

3. Deixar o palivizumabe reconstituído em repouso, em temperatura ambiente por, no mínimo, 20 minutos, até que a solução fique límpida.



4. O palivizumabe reconstituído não contém conservantes e **deve ser administrado até 6 horas após a reconstituição.**



Frasco-ampola de uso único. Desprezar as porções não utilizadas.

Palivizumabe reconstituído deve ser administrado por injeção intramuscular. Quando reconstituído conforme recomendado em bula, a solução contém 100 mg/ml de Palivizumabe.

Instrução para administração Solução para injeção (líquida) Pronta para Uso

1  Retire o frasco da geladeira.

2  Remova o lacre da tampa do frasco e limpe a tampa da borracha com etanol a 70% ou equivalente.

3  Insira a agulha no frasco e retire na seringa um volume apropriado de solução de acordo com a dose desejada. Synagis Solução para Injeção não contém conservante, é de uso único e deve ser administrado imediatamente depois de retirar a dose da seringa



- Não misture as formulações líquida e liofilizada
- Não misture com outros medicamentos
- Não dilua o produto
- Não agite o frasco

Este medicamento é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS – para prevenção da infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório em crianças com menos de 01 ano de idade que nasceram prematuras com idade gestacional \leq 28 semanas e crianças com até 2 anos de idade com doença pulmonar crônica, displasia broncopulmonar ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada, conforme estabelecido pela portaria conjunta MS nº 23 de 03 de outubro de 2018.