



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS

SITUAÇÃO CLÍNICA Medicamentos	ABERTURA PROCESSO (1ª vez)	MONITORIZAÇÃO (Renovação de Exames)	CID-10 Médico Especialista
ACNE GRAVE (Protocolo MS) Isotretinoína 10mg cáps. (Indisponível – Nota técnica) Isotretinoína 20mg cáps. Documentação para abertura	- Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original (LME) - Colesterol Total e frações, Triglicerídeos e ALT/TGP e AST/TGO (validade 90 dias); - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. - Informar em laudo médico ou no LME o tempo de tratamento e medicamentos utilizados anteriormente.	- Colesterol Total e frações, Triglicerídeos, ALT/TGP e AST/TGO. Periodicidade: aos 30 dias e, após, trimestral. - BHCG para mulheres em idade fértil. Periodicidade: Mensal.	L70.0 L70.1 L70.8 Dermatologista (Preferencialmente) PCDT
ACROMEGALIA (Protocolo MS) Cabergolina 0,5mg comp. Lanreotida 60mg, 90mg e 120mg seringa preenchida Octreotida 0,1mg/ml ampola, 20mg e 30mg pó para suspensão F/A Documentação para abertura	- LME contendo informações sobre a clínica do paciente e se há contraindicação ou refratariedade ao tratamento cirúrgico (validade 90 dias); - Dosagem de GH e IGF-1 basal e teste de supressão de GH após sobrecarga de glicose (dispensado se o paciente for diabético) (validade 180 dias); - Ressonância magnética de sela turca, preferencialmente, ou tomografia computadorizada (validade 24 meses); - Glicose de jejum, cortisol, TSH, T4 livre, prolactina, LH, FSH, testosterona total (para homens) (validade 90 dias).	- Dosagem de GH e IGF-1 basais e teste de supressão de GH após sobrecarga de glicose (dispensado se o paciente for diabético). Periodicidade: Trimestral até um ano após controle da doença, e depois anualmente.	E22.0 Endocrinologista (Exclusivamente) Devem ser atendidos em serviços especializados em Neurocirurgia com endocrinologia ou neuroendocrinologia, preferentemente de centros de referência. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



AMILOIDOSES ASSOCIADAS À TRANSTIRRETINA (Protocolo MS) Tafamidis 20mg cáps (acima de 18 anos) Tafamidis 61 mg cáps (acima 60 anos) Documentação para abertura	Para todos: - Laudo de exame genético do gene <i>TTR</i> ou, se possível, biópsia do órgão afetado (sem validade); - Exames laboratoriais: Uréia, creatinina, sódio, potássio, glicemia, eletroforese de proteínas, colesterol total e frações, triglicerídeo, exame de urina (EAS, proteinúria) (validade 90 dias); - Laudo de avaliação oftalmológica (pressão ocular e avaliação do vítreo). (Validade 1 ano) - Beta HCG atual em mulheres em idade fértil (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade). Para Tafamidis 20mg, acrescentar: - Relato médico, informando (validade 90 dias): - o Sintomatologia apresentada; - o Estágio de gravidade da doença segundo a classificação proposta por Coutinho* recomendada pelo PCDT-MS; - o Se paciente foi submetido a transplante hepático; Para Tafamidis 61mg, acrescentar: - Relato médico, informando (validade 90 dias): - o Sintomatologia apresentada; - o Classe funcional NYHA/OMS do paciente; Obs.: Podem ser solicitados pela Farmácia Cidadã, outros exames/documentos complementares para confirmação do diagnóstico e ao estágio de gravidade da doença.	- Relato médico contendo a evolução clínica e adesão ao acompanhamento/tratamento; Periodicidade: semestral. - Exame neurológico clínico com inclusão escalas como Polyneuropathy Disability Score (PND) e avaliação sensitivo-motora pelo Neuropathy Impairment Score (NIS). Periodicidade: semestral. - Exames laboratoriais: ureia, creatinina, sódio, potássio, glicemia, eletroforese de proteínas, colesterol total e frações, triglicerídeo, exame de urina (EAS, proteinúria); Periodicidade: Semestral - Laudo de avaliação oftalmológica (pressão ocular e avaliação do vítreo). Periodicidade: anual.	E85.1 (somente para Tafamidis 20mg cáps) E85.0 e E85.8 (somente para Tafamidis 61mg cáps) Neurologista Cardiologista (preferencialmente) Devem ser atendidos preferencialmente em serviços especializados ou de referência em doenças raras. PCDT
ANEMIA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA - ALFAEPOETINA (Protocolo MS) Alfaepoetina/Eritropoetina Recombinante Humana 1.000 UI, 2.000 UI, 3.000 UI, 4.000 UI, 10.000 UI Documentação para abertura *Atualizado em 01/04/2025	- Hemoglobina (validade 30 dias); - Hemograma (validade 90 dias); - Índice de Saturação de Transferrina (validade 90 dias); - Ferritina Sérica (validade 90 dias); - Creatinina sérica (validade 90 dias); - Informação do estágio da DRC, e se paciente encontra-se em Terapia Renal Substitutiva – hemodiálise ou diálise peritoneal, descrito no próprio LME ou em laudo médico à parte (validade 90 dias).	- Hemoglobina e Hematócrito. Periodicidade: Mensal. - Ferritina sérica, índice de saturação de transferrina e hemograma completo. Periodicidade: Trimestral. - Creatinina sérica. Periodicidade: Anual.	N18.0 N18.8 Nefrologista (Exclusivamente) Devem ser acompanhados em serviços especializados de nefrologia com terapia renal substitutiva (hemodiálise e diálise peritoneal). PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



ANEMIA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA – REPOSIÇÃO DE FERRO (Protocolo MS) Sacarato de Hidróxido de Ferro III 100mg/5mL EV amp. Documentação para abertura	- Hemograma Completo, Hematócrito e hemoglobina (validade 30 dias); - Índice de Saturação de Transferrina (validade 90 dias); - Ferritina sérica (validade 90 dias); - Creatinina Sérica (validade 90 dias); - Informação do estágio da DRC, se paciente está em programa de hemodiálise, descrito no próprio LME ou em laudo médico à parte. Caso paciente esteja em tratamento conservador ou diálise peritoneal informar se paciente usou ferro oral e apresentou intolerância gastrointestinal, inadequada adesão ou resposta insuficiente (validade 90 dias).	- Hemoglobina e hematócrito. Periodicidade: Mensal. - Ferritina sérica, Índice de saturação de transferrina e Hemograma completo. Periodicidade: Trimestral.	N18.0 N18.8 Nefrologista (Exclusivamente) Devem ser acompanhados em serviços especializados de hemodiálise/nefrologia. PCDT
ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE (Protocolo MS) Ciclofosfamida 50mg drágea Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosposrina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50mL) Imunoglobulina humana 2,5g e 5g injetável. Documentação para abertura	Para todos: - Relato médico em LME quanto aos sintomas sugestivos de AHAI (validade 3 meses) - Hemograma completo; (validade 3 meses) - Exames para comprovação de hemólise: Contagem de reticulócitos ou Dosagem de Desidrogenase láctica (DHL) ou de haptoglobina ou de Bilirrubina (total e frações); (validade 3 meses) - Teste de Coombs; (validade 3 meses) - Exame(s) de detecção de autoanticorpos que comprovem o subtipo da anemia hemolítica autoimune: IgG e/ou C3d na superfície das hemácias; ou IgA com resultados negativos para IgG e C3d; ou pesquisa de crioaglutinas; (validade 3 meses). Para ciclofosfamida, acrescentar: - ALT/TGP, AST/TGO, GGT e bilirrubinas (validade 3 meses) Para Ciclosporina, acrescentar: - Creatinina. (validade 3 meses)	- Hemograma completo. Periodicidade: mensal nos primeiros 6 meses, após trimestral, ou a cada alteração de dose. Para Ciclofosfamida: - ALT/TGP, AST/TGO, GGT e bilirrubinas. Periodicidade: mensal nos primeiros 6 meses, após trimestral. Para Ciclosporina: - Creatinina. Periodicidade: mensal nos primeiros 6 meses, após trimestral. - Dosagem sérica do fármaco. Periodicidade: semestral. Para Imunoglobulina: - Creatinina. Periodicidade: mensal nos primeiros 6 meses, após trimestral.	D59.0 D59.1 PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

ANGIOEDEMA (Protocolo Estadual) Ácido tranexâmico 250mg comp. Icatibanto 10mg/mL seringa preenchida Documentação para abertura	Todos: - Dosagem de complemento C4 (sem validade); - Dosagem da fração C1-INH quantitativo (sem validade); - Dosagem da fração C1-INH funcional (sem validade). Para Danazol: - Laudo médico descrevendo a frequência dos episódios de angioedema e situações que contraindiquem o uso do danazol: (1) Mulher com sangramento genital de origem desconhecida; (2) Disfunção grave hepática, renal ou cardíaca; (3) Gravidez ou lactação; (4) Porfiria; (5) hipersensibilidade ou intolerância ao medicamento; (6) Neoplasia de próstata. (validade 90 dias)	- Ultrassonografia abdominal. Periodicidade: Semestral.	D84.1 Alergista e Imunologista (Preferencialmente). Ac. Tranexâmico – Protocolo Estadual Icatibanto – Protocolo Estadual
ANGIOEDEMA (Protocolo MS) Danazol 100mg cáps. (Indisponível - Nota Técnica) Documentação para abertura	- Dosagem de complemento C4 (sem validade); - Dosagem da fração C1-INH quantitativo (sem validade); - Dosagem da fração C1-INH funcional (sem validade). Para Danazol: - Laudo médico descrevendo a frequência dos episódios de angioedema e situações que contraindiquem o uso do danazol: (1) Mulher com sangramento genital de origem desconhecida; (2) Disfunção grave hepática, renal ou cardíaca; (3) Gravidez ou lactação; (4) Porfiria; (5) hipersensibilidade ou intolerância ao medicamento; (6) Neoplasia de próstata. (validade 90 dias)	- Hematócrito e hemoglobina, TGO, TGP, gama GT, fosfatase alcalina; - Colesterol total e frações, triglicerídeos; - Exame qualitativo de urina. Periodicidade: Semestral.	Angioedema (PCDT)
ARTRITE PSORÍACA (Protocolo MS) Adalimumabe 40mg seringa Certolizumabe pegol 200mg/ml - injetável Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps. Ciclosporina 100mg/ml solução oral (frasco 50 mL) Etanercepte 25mg e 50mg seringa Golimumabe 50mg injetável	Para Todos: Exigido uma única vez na abertura de processo, não necessário para substituição de medicamentos: - o Relato médico detalhado informando as manifestações clínicas do paciente conforme critérios de classificação da artrite psoriásica (CASPAR) (validade 3 meses); - o Laudo de imagem (Raio-X ou Ultrassom ou Ressonância Magnética) da(s) área(s) afetada(s) (sem validade); - Necessário para abertura e nas substituições de medicamentos: - o Relato médico informando: • os medicamentos previamente utilizados, tempo de uso e a evolução clínica durante sua utilização;	Para todos os medicamentos: - Relato médico detalhando a evolução clínica contendo o índice da atividade da doença - MDA ou DAPSA ou LEI ou ASDAS ou PASI. Periodicidade: Semestral. - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP e creatinina. Periodicidade: Trimestral nos primeiros 6 meses. Após, semestral.	M07.0 M07.2 M07.3 Reumatologista (Preferencialmente) Devem ser atendidos por equipe em serviço especializado, que conte com reumatologista ou médicos com experiência e familiaridade com manifestações clínicas próprias desta doença. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



Infliximabe 100mg F/A Ixequizumabe 80 mg injetável (Indisponível: item ainda não disponibilizado pelo Ministério da Saúde) Leflunomida 20mg comp. Metotrexato 25mg/ml solução injetável e 2,5mg comp. Naproxeno 500mg comp. Secuquinumabe 150 mg/mL injetável Sulfassalazina 500mg comp. Tofacitinibe 5mg comp Documentação para abertura	- valor do índice da atividade da doença segundo o componente predominante (DAPSA ou ASDAS ou LEI ou PASI) (validade 3 meses); o Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, creatinina, Proteína C Reativa (PCR), Velocidade de hemossedimentação (VHS) (validade 3 meses). Para Metotrexato e Leflunomida, acrescentar: - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Adalimumabe, Certolizumabe Pegol, Etanercepte, Golimumabe, Infliximabe, Tofacitinibe e Secuquinumabe, acrescentar: - Exigido somente uma vez no início de qualquer um desses medicamentos, não necessário para substituição: - PPD ou IGRA (validade 1 ano); - Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano); - HBsAg; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano).		
ARTRITE REATIVA - DOENÇA DE REITER (Protocolo MS) Sulfassalazina 500mg comp. Documentação para abertura * atualizado em 10/08/2021	- Quadro clínico de monoartrite ou oligoartrite assimétrica predominantemente de membros inferiores, com história comprovada ou sugestiva de infecção genitourinária ou gastrointestinal nas 4 semanas anteriores ao aparecimento dos sinais articulares. (Validade 90 dias).	- Hemograma completo, EAS, Velocidade de sedimentação globular ou hemossedimentação. Periodicidade: no primeiro mês e após, a cada 6 meses.	M02.3 M02.1 M03.2 M03.6 Reumatologista (Preferencialmente). PCDT
ARTRITE REUMATÓIDE (Protocolo MS)	Para Todos: Exigido somente uma única vez na abertura de processo, não necessário para substituição de medicamentos:	Para todos os medicamentos: Índice Combinado de Atividade da Doença (ICAD): DAS 28 OU SDAI OU CDAI.	M05.0 M05.1

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



Abatacepte 125mg injetável - Subcutâneo (acima de 18 anos) (Indisponível - Nota Técnica) Adalimumabe 40mg injetável – seringa Azatioprina 50mg comp. Baricitinibe 2mg e 4mg comp. Certolizumabe pegol 200mg/ml – injet. Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps. Ciclosporina sol. Oral 100mg/ml (frasco 50 mL) Etanercepte 25mg e 50mg injet. Golimumabe 50mg – injet. Infliximabe 100mg – injet. Hidroxicloroquina 400mg comp. Leflunomida 20mg comp. Metotrexato 2,5mg comp. e 25mg/ml injet. Naproxeno 500mg comp. Rituximabe 500mg F/A injet. Sulfasalazina 500mg comp. Tocilizumabe 20mg/ml injet. Tofacitinibe 5mg - comp. Upadacitinibe 15mg - comp. Documentação para abertura	- o Laudo de imagem (Raios-X ou Ultrassom ou Ressonância Magnética) da(s) área(s) afetada(s) (sem validade); - o Fator reumatoide sérico OU anti-CCP (sem validade). - Necessário para abertura e nas substituições de medicamentos: - o Relato médico informando os medicamentos utilizados, tempo de uso e a evolução clínica durante sua utilização. - o Índice Combinado de Atividade da Doença (ICAD): DAS 28 OU SDAI OU CDAI (validade 3 meses). - o Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, Proteína C Reativa, VHS, creatinina (validade 3 meses). Para Hidroxicloroquina, acrescentar: - Avaliação oftalmológica (validade 1 ano). Para Metotrexato e Leflunomida, acrescentar: - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Abatacepte, Adalimumabe, Baricitinibe, Certolizumabe pegol, Etanercepte, Golimumabe, Infliximabe, Rituximabe, Tocilizumabe, Tofacitinibe e Upadacitinibe, acrescentar: - Exigido somente uma vez no início de qualquer um desses medicamentos, não necessário para substituição: - PPD ou IGRA (validade 1 ano). - Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano). - HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano).	Periodicidade: Semestral. - Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP e creatinina. Periodicidade: Trimestral nos primeiros 6 meses. Após, semestral. Para Hidroxicloroquina, acrescentar: - Avaliação oftalmológica. Periodicidade: anual.	M05.2 M05.3 M05.8 M06.0 M06.8 Reumatologista (Preferencialmente) PCDT
---	--	--	--

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL (Protocolo MS) Abatacepte 250mg injetável – F/A Intravenoso Adalimumabe 40mg injetável – seringa preenchida Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps. Ciclosporina sol. Oral 100mg/ml (frasco 50 mL) Etanercepte 25mg e 50mg injet. Infliximabe 100mg injetável Leflunomida 20mg comp. Metotrexato 2,5mg comp. e 25mg/ml injetável Naproxeno 500mg comp. Sulfassalazina 500mg comp. Tocilizumabe 20mg/ml Documentação para abertura	Para Todos: - Relato médico detalhado informando: - o as manifestações clínicas do paciente; - o classificação do subtipo de Artrite Idiopática Juvenil e exames de comprovação de órgãos e sistemas envolvidos; - o os medicamentos previamente utilizados, tempo de uso e a evolução clínica durante sua utilização. - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, Proteína C Reativa, VHS, creatinina (validade 3 meses). Para metotrexato e leflunomida, acrescentar: - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Abatacepte, Adalimumabe, Etanercepte, Infliximabe, Tocilizumabe, acrescentar: - Exigido somente uma vez no início de qualquer um desses medicamentos, não necessário para substituição: - PPD ou IGRA (validade 1 ano); - Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano); - HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano). Atenção: Outros exames podem ser solicitados a critério da comissão avaliadora.	Para todos os medicamentos: - Relato médico informando a evolução clínica do paciente. Periodicidade: Semestral. - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP e creatinina. Periodicidade: Trimestral nos primeiros 6 meses. Após, semestral.	M08.0 M08.1 M08.2 M08.3 M08.4 M08.8 M08.9 Reumatologista (Preferencialmente) PCDT
--	---	--	--



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



ASMA GRAVE (Protocolo MS) Budesonida 200mcg e 400mcg cápsula inalante ou pó inalante ou aerossol bucal Formoterol 12mcg cápsula inalante ou pó inalante Formoterol + budesonida 6+200mcg e 12+400mcg cápsula inalante ou pó inalante Mepolizumabe 100mg injetável (acima 12 anos) Omalizumabe 75mg e 150mg e seringa preenchida (acima de 6 anos) Recém incorporados, ainda não disponíveis: - Mepolizumabe 40mg injetável (entre 6 a 11 anos) - Benralizumabe 30mg injetável (acima 18 anos) - Dupilumabe 200mg e 300mg seringa preenchida (acima de 6 anos) Documentação para abertura	Para todos: - Formulário de inclusão Asma - Espirometria para pacientes acima de 6 anos (validade 180 dias). *ATENÇÃO: Na impossibilidade da realização da espirometria, deverá apresentar justificativa pormenorizada desta impossibilidade em relatório médico para avaliação. Para Benralizumabe e Mepolizumabe: - Hemograma (validade 90 dias); - Laudo de exame de imagem do Tórax (Raio-X em PA e Perfil ou tomografia computadorizada) (validade 360 dias). - Teste de Controle de Asma - ACT do mês anterior a prescrição. Para Dupilumabe e Omalizumabe: - Hemograma (validade 90 dias); - IgE total (validade 90 dias); - IgE específica positiva ou teste cutâneo de leitura imediata positivo (sem validade); - Laudo de exame de imagem do Tórax (Raio-X em PA e Perfil ou tomografia computadorizada) (validade 360 dias). - Teste de Controle de Asma - ACT do mês anterior a prescrição. - pacientes abaixo de 12 anos. - pacientes acima de 12 anos.	Para todos: - Espirometria. Periodicidade: A cada dois anos. Exceto para pacientes em uso de imunobiológico, que deve ser anual Para imunobiológicos (Benralizumabe, Dupilumabe, Mepolizumabe e Omalizumabe), acrescentar: - Laudo médico informando resposta ao tratamento e o número de exacerbações no período; - ACT do último mês. - pacientes abaixo de 12 anos. - pacientes acima de 12 anos. Periodicidade: Semestral	J45.0 J45.1 J45.8 Pneumologista Alergista (Exclusivamente apenas para Imunobiológicos) PCDT
ASMA (Protocolo Estadual) Salmeterol + fluticasona 25mcg + 125mcg aerossol Montelucaste 4mg comp. Montelucaste 4mg sachê (Indisponível - Nota técnica) Documentação para abertura	- Formulário de inclusão para Asma. - Espirometria para pacientes acima de 5 anos (validade 180 dias). *ATENÇÃO: Na impossibilidade da realização da espirometria, deverá apresentar justificativa pormenorizada desta impossibilidade em relatório médico para avaliação.	- Espirometria. Periodicidade: Anual.	J45.0 J45.8 J45.9 Pneumologista Alergista (Exclusivamente) Protocolo Estadual

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos I e II (Protocolo MS) Nusinersena 2,4 mg/mL - injetável Risdiplam 0,75 mg/mL – pó para solução oral Documentação para abertura *atualizado em 18/07/2023	- Para abertura de processo: - o Resultado laboratorial genético confirmando AME 5q (qPCR ou MLPA ou NGS) e presença de até três cópias de SMN2 (sem validade); - o Laudo médico informando a evolução clínica, as condições de nutrição e hidratação atuais do paciente e se paciente for: ▪ pré-sintomático: informar histórico familiar de AME; ▪ sintomáticos: informar a data de início dos sintomas (validade 90 dias); - o Cartão de vacinação ou declaração de vacinação atualizada (validade 30 dias); - o Questionário de avaliação clínica de pacientes com ame 5q tipos I e II (validade 90 dias) (apêndice 1 do PCDT-MS) - Para substituição de medicamentos, necessário apenas: - o Relatório médico descrevendo os motivos para substituição do medicamento, conforme os critérios do PCDT-MS (validade 90 dias) - o Questionário de avaliação clínica de pacientes com ame 5q tipos I e II (validade 90 dias) (apêndice 1 do PCDT-MS)	- Questionário de avaliação clínica de pacientes com AME 5q tipos I e II. Periodicidade: trimestral. - Cartão de vacinação ou declaração de vacinação atualizada; Periodicidade: trimestral.	G12.0 G12.1 Equipe médica do Centro de Referência Estadual – Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) PCDT
COLANGITE BILIAR PRIMÁRIA (Protocolo MS) Ácido Ursodesoxicólico 50 mg, 150mg e 300mg comp. Documentação para abertura *Atualizado em 13/11/19	- Laudo médico descrevendo o quadro clínico do paciente em LME; - AST/TGO, ALT/TGP, fosfatase alcalina (FA), gama GT, bilirrubina, albumina sérica (validade 3 meses) - Exames que documentem dois dos critérios abaixo: - Duas dosagens séricas com valores acima do referência de fosfatase alcalina (FA) e/ou gama GT com intervalo mínimo de 6 meses (sem validade); - Presença de Anticorpos antimitocondriais (AAM) ou Anticorpo Antinúcleo (AAN) (padrões específicos à imunofluorescência ou anti-gp210 e anti-sp-100 por Elisa) (sem validade); - Biópsia Hepática de colangite destrutiva não-suprativa (sem validade).	- AST/TGO, ALT/TGP, fosfatase alcalina (FA), gama GT, bilirrubina, albumina sérica; Periodicidade: semestral no primeiro ano, após anual.	K74.3 Gastroenterologista Nutrólogo Proctologista (Preferencialmente) Devem ser atendidos em serviços especializados, preferentemente em centros de referência em hepatologia. PCDT



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



COMPORTAMENTO AGRESSIVO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (Protocolo MS) Risperidona 1mg e 2mg comp. Risperidona sol. oral 1mg/ml solução oral Documentação para abertura	- Ter idade maior ou igual a 5 anos; - Registro do valor da pressão arterial, idade e dados antropométricos: peso, altura e IMC; - Dosagens de colesterol total e frações; - Triglicerídeos; - Glicemia de jejum. (Validade 90 dias).	- Registro do valor da pressão arterial, idade e dados antropométricos: peso, altura e IMC. Periodicidade: em 3, 6 e 12 meses. - Dosagens de colesterol total e frações; - Triglicerídeos; - Glicemia de jejum; - Hemograma completo; - Prolactina. Periodicidade: em 3 e 12 meses. Após, anualmente.	F84.0 / F84.1 F84.3 / F84.5 F84.8 Psiquiatra Neurologista (Preferencialmente). Devem ter acesso a uma equipe multidisciplinar (incluindo, minimamente, um médico com experiência em saúde mental e um psicólogo). PCDT
DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE (Protocolo MS) Biotina 2,5 mg caps. Documentação para abertura	- Teste laboratorial por medida plasmática da atividade enzimática da biotinidase. (sem validade); - ou - Teste colorimétrico qualitativo em cartão de papel-filtro da atividade de biotinidase (resultado da triagem neonatal) (sem validade).	- Relato médico em LME informando a evolução clínica do paciente. Periodicidade: Semestral	E88.9 PCDT
DERMATITE ATÓPICA (Protocolo MS) Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Metotrexato 2,5 mg comprimido Metotrexato 25 mg/mL solução injetável <u>Recém incorporados, ainda não disponíveis:</u> - Dupilumabe 200 e 300 mg sol. inj (6 meses a < 12 anos) - Tacrolimo 0,3 mg/g e 1 mg/g pomada (acima de 2 anos) - Upadacitinibe 15 mg comp (12 anos a < 18 anos) Documentação para abertura	- Formulário para solicitação de medicamento para o tratamento de dermatite atópica - Hemograma, contagem de plaquetas, creatinina, uréia. Para Ciclosporina, acrescentar: - Hemograma completo, creatinina, ureia, AST/TGO, ALT/TGP, gama GT, fosfatase alcalina (validade 90 dias); Para Metotrexato, acrescentar: - Hemograma completo, creatinina, ureia, AST/TGO, ALT/TGP, gama GT, fosfatase alcalina (validade 90 dias); - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Dupilumabe e Upadacitinibe, acrescentar: - Exigido somente uma vez no início de qualquer um desses medicamentos, não necessário para substituição: PPD ou IGRA (validade 1 ano); Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano);	- Relato médico detalhando a evolução clínica contendo a pontuação atualizada da escala de avaliação da gravidade da doença e da Qualidade de Vida Dermatológico. Utilizar as mesmas escalas mencionadas no início de tratamento. Periodicidade: semestral. Para Ciclosporina e Metotrexato: - Hemograma completo, creatinina, uréia, AST/TGO, ALT/TGP, gama GT, fosfatase alcalina. Periodicidade: aos 30 dias e após trimestral. Para Upadacitinibe: - Hemograma completo, creatinina, ureia, AST/TGO, ALT/TGP, gama GT, fosfatase alcalina, Colesterol total e frações, triglicerídeos e creatina fosfoquinase (CPK). Periodicidade: 30 dias e após trimestral.	L20.0 L20.8 Alergologista Dermatologista (Exclusivamente somente para Dupilumabe ou Upadacitinibe) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



	- Upadacitinibe, acrescentar: Hemograma completo, creatinina, ureia, AST/TGO, ALT/TGP, gama GT, fosfatase alcalina, Colesterol total e frações, triglicerídeos e creatina fosfoquinase (CPK) (validade 90 dias). HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano);		
DEFICIÊNCIA DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - HIPOPIUITARISMO (Protocolo MS) Somatropina 4UI e 12UI F/A Documentação para abertura	<u>Para crianças e adolescentes:</u> - Idade cronológica maior que 02 anos; - Idade, peso e altura atuais; - Curva de crescimento com ao menos duas medidas de peso e estatura com intervalo mínimo de 06 meses entre elas; - Estadiamento puberal de Tanner; - Altura dos pais biológicos; - Descrição clínica em laudo médico ou no próprio LME, da deficiência de GH/hipopituitarismo e tratamentos prévios para tal agravo, se houver (validade 90 dias); - Laudo de radiografia de mãos e punhos com determinação de idade óssea; - IGF-1, glicemia, TSH (e demais exames do eixo hipofisário no caso de panhipopituitarismo) e as reposições hormonais realizadas (validade 180 dias); - Ressonância Magnética de hipófise, preferencialmente, ou Tomografia (validade 24 meses); - Dois (2) testes para GH com datas e estímulos diferentes (com insulina, clonidina, levodopa ou glucagon). Validade do teste estímulo: 24 meses. Formulário Teste Provocativo Somatropina - Em casos com alterações anatômicas hipotálamo-hipofisária, história de tratamento com radioterapia e/ou deficiência associada a outros hormônios hipofisários, pode-se aceitar um teste. <u>Para adultos:</u> - Descrição clínica em laudo médico ou no próprio LME, da	<u>Para crianças e adolescentes:</u> - Peso e estatura. Periodicidade: Semestral. - Laudo de Radiografia de mãos e punhos (com idade óssea), glicemia em jejum, TSH e T4 livre. Periodicidade: Anual. - Dosagem de IGF-1 (Fator de Crescimento de Insulina Símile) Periodicidade: Anual ou se houver mudança de dose. <u>Para adultos:</u> - Dosagem de IGF-1. Periodicidade: Anual ou quando houver ajuste de dose. - Densitometria óssea, perfil lipídico, glicemia, TSH e T4 livre. Periodicidade: Anual. - Laudo médico declarando ausência de características acromegálicas e miocardiopatia hipertrófica. Periodicidade: Anual.	E23.0 Endocrinologista (Exclusivamente) Devem passar por avaliação diagnóstica e ter acompanhamento terapêutico com endocrinologistas ou endocrinologistas pediátricos. PCDT

	deficiência de GH/hipopituitarismo e tratamentos prévios para tal agravo, se houver; - IGF-1, glicemia, TSH e demais exames do eixo hipofisário no caso de panhipopituitarismo, e as reposições hormonais realizadas (validade 180 dias); - Colesterol total, HDL e triglicerídeos (validade 90 dias); - Exame de imagem (Ressonância Magnética de hipófise, preferencialmente, ou Tomografia) – (validade 24 meses); - Um (1) teste de estímulo para GH (com insulina, GHRH-arginina ou glucagon); - Densitometria óssea (validade 12 meses).		
DIABETES INSÍPIDO (Protocolo MS) Desmopressina 0,1mg e 0,2 mg comp (Indisponível – ofício circular nº 39/2022/CGCEAF/DAF/SCIE/MS) Desmopressina 0,1mg/ml spray nasal Documentação para abertura	- Relato médico informando diagnóstico de Diabetes Insípido central - Dosagem de volume urinário em 24 hs (validade 3 meses) - Relatório de alta hospitalar ou exames que documentem a resposta à administração de desmopressina: • Osmolalidade plasmática; • Sódio plasmático; • Osmolalidade urinária. (Validade 3 meses)	- Relato médico informando a evolução clínica do paciente quanto ao controle da noctúria e do volume urinário ao longo do dia Periodicidade: semestral. - Dosagem de volume urinário em 24 hs e sódio plasmático. Periodicidade: semestral até estabilização, após anual.	E23.2 Endocrinologista Nefrologista (Exclusivamente) PCDT
DIABETE MELITO TIPO 2 (Protocolo Estadual) Insulina Glargina 100 UI/mL (refil de 3 mL) (paciente acima de 2 anos) Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	- Glicemia capilar de jejum (validade 3 meses); - Hemoglobina glicada (validade 3 meses); - Cópia da automonitorização glicêmica registrada manualmente ou impressa por um período mínimo de 30 dias (validade 6 meses). - Formulário para solicitação de insulina glargina 100UI/mL no tratamento da DM2 e seus exames adicionais a depender da condições clínica	- Glicemia de jejum e hemoglobina glicada; Periodicidade: trimestral e em pacientes controle glicêmico dentro das metas, semestralmente. - Cópia da automonitorização glicêmica registrada manualmente ou impressa por período mínimo de 30 dias. Periodicidade: trimestral e em pacientes controle glicêmico dentro das metas, semestralmente.	E10 / E11 E10.1 / E11.2 E10.2 / E11.3 E10.3 / E11.4 E10.4 / E11.5 E10.5 / E11.6 E10.6 / E11.7 E10.7 / E11.8 E10.8 / E11.9 E10.9 Endocrinologista (Preferencialmente) Protocolo Estadual
DIABETE MELITO TIPO I (Protocolo MS)	- Glicemia de jejum (validade 3 meses); - Hemoglobina glicada (validade 3 meses); - Cópia da automonitorização glicêmica registrada manualmente ou impressa por um período mínimo de 30	- Glicemia de jejum e hemoglobina glicada; Periodicidade: trimestral e em pacientes controle glicêmico dentro das metas,	E10.0 / E10.5 E10.1 / E10.6 E10.2 / E10.7 E10.3 / E10.8 E10.4 / E10.9

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA: Lispro 100 UI/ML (tubete de 3ML) + Caneta Reutilizável (paciente acima de 3 anos) Asparte 100 UI/ML (caneta de 3ML) (paciente entre 1 de 3 anos) INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA: Insulina Glargina 100 UI/mL (Tubete de 3mL) + Caneta Reutilizável (Paciente acima de 2 anos) Insulina Degludeca 100UI/mL (Caneta de 3 mL) (Pacientes entre 1 e 2 anos) Documentação para abertura	dias (validade 3 meses). - Formulário para solicitação de análogos de insulina Diabetes Mellito tipo 1 e seus exames adicionais a depender da condição clínica.	semestralmente. - Cópia da automonitorização glicêmica registrada manualmente ou impressa por um período mínimo de 30 dias. Periodicidade: trimestral e em pacientes controle glicêmico dentro das metas, semestralmente.	Endocrinologista (Preferencialmente) PCDT
DIABETES MELITO TIPO 2 (Protocolo MS) Dapagliflozina 10mg comp Documentação para abertura *Atualizado em 28/02/2024	- Formulário específico para análise de fornecimento de Dapagliflozina e os exames e/ou laudos conforme exigido pelo formulário de acordo com preenchimento de dados; - Hemoglobina glicada (validade 3 meses); - Glicemia em jejum (validade 3 meses); - Valor do Clearance de Creatinina estimado com descrição da fórmula utilizada acompanhado da cópia do exame de creatinina sérica ou exame de Clearance de creatinina (validade 3 meses);	- Hemoglobina glicada e Glicemia em jejum Periodicidade: semestral ou se houver alteração de dose - Valor do Clearance de Creatinina estimado com descrição da fórmula utilizada acompanhado da cópia do exame de creatinina sérica ou exame de Clearance de creatinina Periodicidade: anual	E11.2 E11.3 E11.4 E11.5 E11.6 E11.7 E11.8 E11.9 Endocrinologista (Preferencialmente) PCDT
DISLIPIDEMIAS (Protocolo MS) Ácido Nicotínico 500mg comp lib prol Atorvastatina 10mg, 20mg, 40mg e 80mg comp. Bezafibrato 200mg comp e 400mg comp lib prol. Ciprofibrato 100mg comp. Fenofibrato 200mg cápsula e 250mg cápsula de liberação	- Colesterol Total, HDL, Triglicerídeo, TSH, CPK, AST/TGO, ALT/TGP (validade 90 dias); - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Atorvastatina: Laudo médico que contemple um dos critérios de inclusão para estatinas e justificativa para impossibilidade de uso da sinvastatina. (validade 90 dias) Genfibrozila Laudo médico que contemple um dos critérios de inclusão para	- CPK, TGO e TGP. Periodicidade: semestral ou sempre que houver ajuste de dose. - Colesterol Total, HDL e Triglicerídeo Periodicidade: anualmente.	E78.0 / E78.1 E78.2 / E78.3 E78.4 / E78.5 E78.6 / E78.8 Endocrinologista Cardiologista* (Preferencialmente) * Médicos em atendimento no Serviço de Assistência Especializada em HIV/Aids poderão prescrever atorvastatina

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



retardada. Genfibrozila 600mg comp. (Indisponível - Nota Técnica) Documentação para abertura *Atualizado em 07/01/2026	genfibrozila. (validade 90 dias). e - Caso paciente apresente triglicérideo > 200mg/dL e HDL < 40mg/dL, deverá fornecer duas determinações de cada um desses exames num intervalo mínimo de 2 semanas (validade 90 dias) Para Ciprofibrato, Fenofibrato e Bezafibrato: Laudo médico que contemple um dos critérios de inclusão para fibratos. (Validade 90 dias) Para Ácido nicotínico: Laudo médico que contemple a indicação de uso de estatinas, porém intolerantes ou com contraindicação a elas e que não preencham os critérios para uso de fibratos. (Validade 90 dias)		para pacientes infectados pelo HIV. PCDT
DISTONIAS FOCAIS E ESPASMO HEMIFACIAL (Protocolo MS) Toxina Botulínica tipo A 100UI F/A Toxina Botulínica tipo A 500UI F/A Documentação para abertura	- βHcG para mulheres em idade fértil (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade);	-	G24.3 G24.4 / G24.5 G24.8 G51.3 / G51.8 Neurologista Ortopedista Oftalmologista (Preferencialmente) Recomendam-se serviços especializados e com profissionais capacitados para a aplicação de TBA, contando com especialista(s) em neurologia, neurocirurgia ou fisioterapia. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

DISTÚRBIO MINERAL ÓSSEO NA DOENÇA RENAL CRÔNICA (Protocolo MS) Calcitriol 0,25mcg cápsula Cinacalcete 30mg e 60mg comprimido Desferroxamina 500mg frasco-ampola contendo 500mg de pó liofilizado para solução injetável Paricalcitol ampola de 5mcg/mL contendo 1mL de solução Sevelâmer 800mg comprimido Documentação para abertura *atualizado em 23/03/2026	Para Sevelâmer: <u>Adultos</u> - Laudo médico contendo informações sobre a DRC: fase não dialítica ou dialítica, se apresenta contraindicação aos quelantes de fósforo à base de cálcio (enviar exame comprobatório) e se acompanha com nutricionista (validade 90 dias); - Fósforo sérico (2 determinações, sendo a última com validade de 30 dias). <u>Crianças e adolescentes</u> - Laudo médico contendo informações sobre a DRC: estágio, fase não dialítica ou dialítica, se acompanha com nutricionista e se faz uso de quelantes de fósforo à base de cálcio (validade 90 dias); - Fósforo sérico (2 determinações, sendo a última com validade de 30 dias); - Cálcio sérico total ou cálcio iônico (1 determinação com validade de 30 dias); Para Calcitriol/Paricalcitol: - Laudo médico contendo informações sobre a DRC: estágio, fase não dialítica ou dialítica (hemodiálise ou diálise peritoneal), e se o paciente foi submetido à paratireoidectomia (validade 90 dias); - Fósforo sérico (1 determinação com validade de 30 dias); - Cálcio sérico total ou cálcio iônico (1 determinação com validade de 30 dias); - PTH sérico (2 determinações consecutivas, sendo a última com validade de 90 dias). Para Cinacalcete: -Laudo médico contendo informações sobre a DRC: fase não dialítica ou dialítica, tempo de terapia renal substitutiva, e se foi submetido ao transplante renal (validade 90 dias); - Albumina (validade 90 dias); - Cálcio sérico total ou cálcio iônico (1 determinação com validade de 30 dias); - PTH sérico (2 determinações consecutivas, sendo a última com validade de 90 dias). Para Desferroxamina: <u>Para realização do teste de diagnóstico de excesso de alumínio:</u> - Alumínio (validade 90 dias) OU - Laudo médico informando se o paciente apresenta sinais e sintomas clínicos sugestivos de intoxicação por alumínio ou se há programação de paratireoidectomia (validade 90 dias).	Para Sevelâmer: - Fósforo sérico; Periodicidade: 30 dias para pacientes com DRC em diálise; 90 dias para pacientes com DRC em tratamento conservador. Para Calcitriol: - Cálcio sérico total ou iônico; - Fósforo sérico; Periodicidade: 30 dias para pacientes com DRC em diálise; 90 dias para pacientes com DRC em tratamento conservador. - PTH. Periodicidade: 90 dias. Para Paricalcitol: - Cálcio sérico total ou iônico; - Fósforo sérico; Periodicidade: 30 dias. - PTH. Periodicidade: 90 dias. Para Cinacalcete: - Cálcio sérico total ou iônico; Periodicidade: 30 dias para pacientes com DRC em diálise; 90 dias para pacientes transplantados. - PTH. Periodicidade: 90 dias. Para Desferroxamina: - Avaliação Oftalmológica e Otorrinolaringológica. Periodicidade: Anual.	N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N25.0 Nefrologista (Exclusivamente) Devem ser atendidos em serviços especializados. PCDT
--	--	--	---



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



	<u>Para realização do tratamento da intoxicação aluminica:</u> - Alumínio sérico (validade 90 dias); - Teste positivo da desferroxamina ou biópsia óssea (sem validade); - Avaliação Oftalmológica e Otorrinolaringológica (validade 1 ano).		
DOENÇA DE ALZHEIMER (Protocolo MS) Donepezila 5mg e 10mg comp Galantamina 8mg, 16mg e 24mg cáps de liberação prolongada Memantina 10mg comp Rivastigmina 1,5mg, 3mg, 4,5mg e 6mg cápsulas Rivastigmina solução oral 2mg/mL frasco Rivastigmina 9mg (5cm²) e 18mg (10cm²) adesivo transdérmico Documentação para abertura	Exigido uma única vez para abertura de processo, não necessário para substituição de medicamentos: ○ Tomografia computadorizada ou Ressonância magnética do encéfalo (validade 24 meses) ○ Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, creatinina, ureia, sódio, potássio, cálcio, glicose, TSH, vitamina B12 e ácido fólico (validade 90 dias) ○ Sorologia: VDRL e Anti-HIV (validade 1 ano) - Necessário para abertura e nas substituições de medicamentos: Mini exame do Estado Mental (MEEM) (validade 90 dias) Avaliação Clínica Da Demência - CDR (validade 90 dias) Se a substituição for para iniciar o uso da Memantina, acrescentar: - Creatinina.	Para todos: - Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e Escala de Avaliação Clínica da Demência (CDR). Periodicidade: Semestral. Para Galantamina: - Creatinina, ALT/TGP, AST/TGO. Periodicidade: Semestral. Para Memantina: - Creatinina. Periodicidade: Semestral	F00.0 F00.1 F00.2 G30.0 G30.1 G30.8 Neurologista Geriatra Psiquiatria (Preferencialmente) PCDT


NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

DOENÇA DE CROHN (Protocolo MS) Adalimumabe 40mg injetável. (A partir de 6 anos de idade) Azatioprina 50mg comp. Certolizumabe pegol 200mg/mL injetável. (Acima de 18 anos) Infliximabe 100mg injetável. (A partir de 6 anos de idade) Mesalazina 400mg comp, 500mg comp e 800mg comp. Metotrexato 25mg/mL injetável. Sulfasalazina 500mg comp. Documentação para abertura	Para todos os medicamentos: - Laudo médico informando detalhadamente a clínica do paciente, tratamentos prévios realizados e recaída doença/ano (validade 3 meses); - Índice de Harvey-Bradshaw (IHB) (validade 3 meses); - Laudo dos exames (validade 1 ano): - o Endoscópico (colonoscopia); ou radiológico (radiografia de trânsito do delgado ou TC enteral ou RM enteral); ou anátomo-patológico; ou cirúrgico. Para Sulfasalazina e Mesalazina, acrescentar: - Hemograma, EQU (EAS) e creatinina (validade 3 meses). Para Azatioprina, acrescentar: - Hemograma Completo, AST/TGO, ALT/TGP (validade 3 meses). Para Metotrexato, acrescentar: - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, creatinina e ureia (validade 3 meses). Para Adalimumabe, Certolizumabe pegol, Infliximabe, acrescentar: - Exigido somente uma vez no início de qualquer um desses medicamentos, não necessário para substituição: - o PPD ou IGRA (validade 1 ano); - o Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano); - o HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano); - o Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, creatinina e ureia (validade 3 meses); - o Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. - Para substituição/troca entre eles: - o Relato médico detalhando os sintomas clínicos; - o Índice de Harvey-Bradshaw (IHB); - o Laudo de exame endoscópico (colonoscopia ou retossigmoidoscopia) (validade 1 ano). Doença de Crohn - Índice de Harvey-Bradshaw PDF	Para todos os medicamentos: - Índice de Harvey-Bradshaw (IHB). Periodicidade: Semestral e quando houver mudança de dose ou troca do medicamento. Para Azatioprina: - Hemograma completo, AST/TGP e ALT/TGO. Periodicidade: Trimestral. Para Metotrexato: - Hemograma completo, AST/TGP e ALT/TGO, creatinina e uréia. Periodicidade: Trimestral Para Sulfasalazina e Mesalazina: - Hemograma, EQU (EAS) e creatinina. Periodicidade: Semestral. Para Adalimumabe, Certolizumabe pegol e Infliximabe: - Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP. Periodicidade: Trimestral. Para otimização de dose de Adalimumabe, Certolizumabe pegol e Infliximabe: - Demonstração de doença ativa, determinada por sintomas clínicos em laudo médico ou por marcadores biológicos de inflamação ou por achados endoscópicos (colonoscopia). - Índice de Harvey-Bradshaw (IHB).	K50.0 K50.1 K50.8 Gastroenterologista Proctologista (Exclusivamente) PCDT
---	--	---	--

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



DOENÇA DE POMPE (Protocolo MS) ALFA-ALGLICOSIDASE 50MG INJETÁVEL Documentação para abertura *Atualizado em 03/08/2022	- Laudo médico descrevendo os sinais e sintomas do diagnóstico de Doença de Pompe Precoce iniciados durante o primeiro ano de vida Exame laboratorial: - Atividade da enzima alfa glicosidase ácida em fibroblastos ou leucócitos, com atividade da enzima de referência, avaliada na mesma amostra e pelo mesmo método; ou - Exame genético de pesquisa de variantes patogênicas em homozigose ou heterozigose composta no gene GAA:	- Relato médico descrevendo a evolução clínica, o estado nutricional, o número de infusão realizada no período e adesão ao tratamento Periodicidade: semestral - Laudo fonoaudiológico - Laudo de pneumologista - Ecocardiograma. Periodicidade: anual	E74.0 PCDT
--	---	--	---

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

DOENÇA DE FABRY (Protocolo MS) Alfagalsidase 1mg/mL F/A (acima de 7 anos) Betagalsidase 35 mg F/A (acima de 7 anos) Documentação de abertura *Atualizado em 27/01/2025	Para TODOS: - Laudo de Eletrocardiograma (sem validade) - Cópias dos exames: - o Hemograma com plaquetas, eletrólitos, creatinina, uréia, perfil lipídico (HDL, colesterol total, triglicerídeos, LDL-C) e glicemia de jejum (validade 90 dias); e - o Albuminúria, proteinúria e taxa de filtração glomerular (TFG) estimada ou clearance de creatinina. (validade 90 dias) Exigido uma única vez para abertura de processo, não necessário para substituição/troca de medicamentos, acrescentar: - Para homens com 18 anos ou mais de idade: - o Laudo de exame da atividade da enzima αGAL-A; (sem validade) ou - o Laudo de exame genético (análise do DNA) que demonstre mutação patogênica do gene que codifica a enzima αGAL-A (sem validade). - Para mulheres com 18 anos ou mais de idade: - o Laudo de exame genético (análise do DNA) que demonstre mutação patogênica do gene que codifica a enzima αGAL-A; (sem validade) ou - o Laudo de exame genético familiar que documente ser paciente heterozigota portadora de mutação patogênica no gene da αGAL-A; (sem validade) ou - o Comprovação de ao menos uma das alterações bioquímicas extremamente sugestivas do diagnóstico de DF: ▪ aumento na excreção urinária de GL-3; ou evidência histológica de acúmulo de GL-3), associada a, ao menos, uma das manifestações clínicas altamente sugestivas de DF (angioqueratoma confirmado por biópsia ou córnea verticilata) (sem validade) - Para crianças (7 a 17 anos): - o relato médico informando o diagnóstico clínico do paciente, detalhando as manifestações e sintomas da doença (validade 90 dias); ou - o Laudo de biópsia renal demonstrando lesão podocitária (sem validade)	Para TODOS: - Laudo de Eletrocardiograma Periodicidade: anual. - Hemograma com plaquetas, eletrólitos, creatinina, uréia, perfil lipídico (HDL, colesterol total, triglicerídeos, LDL-C) e glicemia de jejum; Periodicidade: anual. - Albuminúria, proteinúria e taxa de filtração glomerular (TFG) estimada ou clearance de creatinina. Periodicidade: anual.	E75.2 Devem ser atendidas em serviços especializados em genética. PCDT
--	---	--	---



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



DOENÇA DE GAUCHER (Protocolo MS) Imiglucerase 400 U injetável F/A Alfavelaglicerase 400 U injetável F/A Alfataliglicerase 200 U injetável F/A Miglustate 100mg cáps. Documentação para abertura	Para todos: - Laudo médico informando: Diagnóstico clínico de DG tipo 1 ou tipo 3 com descrição das manifestações clínicas associadas; Medida do tamanho do fígado e do baço; Descrição do(s) critério(s) atendidos pelo paciente para indicação da Terapia de Reposição Enzimática; (validade 3 meses) - Exames de comprovação diagnóstica: Exame genético; OU Exames bioquímicos da atividade da enzima beta-glicocerebrosidase em leucócitos ou fibroblastos associado ao diagnóstico molecular ou do aumento significativo da quitotriosidase; (sem validade) - Hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP, Ferritina, GGT tempo de protrombina e vitamina B12 (validade 3 meses); Para Miglustate, acrescentar: - Laudo médico informando: Presença de quadro clínico instável apesar do uso da TER; ou Condição médica que contraindique o uso de TER (validade 3 meses) Atenção: Outros exames podem ser solicitados a critério da comissão avaliadora.	- Laudo médico informando a adesão ao tratamento (frequência de administração do medicamento e de participação em consultas médicas) e a evolução do quadro clínico do paciente com registro atualizadas do tamanho do fígado e baço. Periodicidade: semestral. - Hemograma completo. Periodicidade: semestral. - AST/TGO, ALT/TGP, Ferritina, GGT tempo de protrombina e vitamina B12. Periodicidade: Anual. Atenção: Outros exames podem ser solicitados a critério da comissão avaliadora.	E75.2 PCDT
---	--	--	---

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



DOENÇA DE PAGET (Protocolo MS) Ácido Zoledrônico 5mg/100mL F/A Calcitonina 200UI Spray Nasal Risedronato 35mg comp. Documentação para abertura	- Laudo médico detalhando a clínica do paciente, descrevendo, quando presente, a sintomatologia apresentada (validade 6 meses); - Exame de imagem (cintilografia óssea ou radiografia simples ou Tomografia computadorizada ou Ressonância Magnética do crânio e ossos longos) comprovando o Diagnóstico da doença (validade 1 ano); - Fosfatase Alcalina, PTH, Cálcio sérico, Vitamina D, AST/TGO, ALT/TGP, Bilirrubina total e frações (validade 90 dias); - Valor do Clearance de Creatinina estimado com descrição da fórmula utilizada acompanhado da cópia do exame de creatinina sérica ou exame de Clearance de creatinina (validade 90 dias); Para ácido zoledrônico: - Laudo de gastroenterologista e/ou exame de endoscopia digestiva alta referente a impossibilidade/contra-indicação de uso aos bifosfonatos orais (validade 180 dias).	- Fosfatase Alcalina e cálcio sérico; Periodicidade: Semestral no primeiro ano, após, anual.	M88.0 M88.8 Reumatologista Ortopedista (Preferencialmente) PCDT
DOENÇA DE PARKINSON (Protocolo MS) Amantadina 100mg comp Clozapina 25mg e 100mg comp Entacapona 200mg comp Pramipexol 0,125mg, 0,25mg e 1mg comp Rasagilina 1mg comp Rivastigmina 1,5mg, 3mg, 4,5mg e 6mg cáps. Rivastigmina 9mg e 18mg adesivo transdérmico Rivastigmina 2mg/mL sol. oral Triexifenidil 5mg comp* (*item atualmente sem demanda. Após abertura e deferimento do processo, seu fornecimento deverá aguardar	Para todos: - Relato médico sobre a clínica do paciente confirmando o diagnóstico de parkinson, que pode estar descrita no próprio LME ou em laudo médico à parte (validade 90 dias). Para Amantadina: - Ureia e creatinina (validade 90 dias). Para Clozapina: - Hemograma completo (validade 90 dias). Para Rivastigmina: - Relato médico informando data de início da Doença de Parkinson; Mini exame do estado mental (validade 90 dias) Avaliação Clínica Da Demência - CDR (validade 90 dias) - Exames que documentem o diagnóstico a demência na Doença de Parkinson: • Tomografia computadorizada ou Ressonância	Para Amantadina: - Ureia, creatinina. Periodicidade: Semestral. Para Clozapina: - Hemograma completo. Periodicidade: Mensal. Para Entacapona: - ALT/TGP, AST/TGO. Periodicidade: Mensal nos primeiros 6 meses. Após, semestral Para Rivastigmina: - Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e Escala de Avaliação Clínica da Demência (CDR). Periodicidade: Semestral.	G20 Neurologista Geriatra (Preferencialmente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

finalização de processo licitatório). Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	- magnética do encéfalo (validade 24 meses) - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, creatinina, ureia, sódio, potássio, cálcio, glicose, TSH, vitamina B12 e ácido fólico (validade 90 dias) - Sorologia: VDRL e Anti-HIV (validade 1 ano)		
DOENÇA DE WILSON (Protocolo MS) Penicilamina 250mg cápsula Trientina 250mg cápsula Documentação para abertura	- Formulário para Avaliação para Doença de Wilson Cópias dos exames comprobatórios das pontuações do formulário.	Para todos: - Dosagem de cobre urinário de 24h. Periodicidade: Após o primeiro e terceiro mês de tratamento. - Dosagem de cobre sérico livre Periodicidade: Após os 3 meses iniciais de tratamento até o correto ajuste de dose. Após ajuste, monitorização deve ser semestral Para Penicilamina, acrescentar: - TGO e TGP, bilirrubina total e frações, fosfatase alcalina. Periodicidade: Semestral. Para Trientina, acrescentar: - Ferritina sérica Periodicidade: semestral	E83.0 Neurologista Gastroenterologistas (Exclusivamente) Devem ser atendidos em serviços que disponibilizem o acesso a gastroenterologistas e neurologistas. PCDT
DOENÇA FALCIFORME (Protocolo MS) Alfaepoetina 1.000 UI, 2.000 UI, 3.000 UI, 4.000UI e 10.000UI injetável (por frasco-ampola) (acima de 18 anos) Hidroxiuréia cáps de 500mg Hidroxiuréia comp de 100mg Documentação para abertura	Para todos: Exigido uma única vez na abertura de processo, não necessário para substituição de medicamentos: - este de fracionamento da hemoglobina por cromatografia líquida de alta performance (HPLC), eletroforese de hemoglobina, focalização isoelétrica (IEF) ou detecção molecular de mutação em hemoglobinopatias (sem validade) Para Hidroxiuréia, acrescentar: - Hemograma completo com contagem de reticulócitos, (validade 90 dias) - Dosagem sérica de creatinina, AST/TGO e ALT/TGP (validade 90 dias) - HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano) - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Alfaepoetina, acrescentar: - Hemograma (validade 90 dias); - informação médica sobre o uso de Hidroxiuréia;	Para hidroxiuréia: - Hemograma e contagem de reticulócitos. Periodicidade: semestral ou a cada alteração de dose, sendo, neste caso, necessário acrescentar receituário médico e relato médico da alteração de dose em LME; - Em pacientes com sorologia positiva para hepatites B e C: Dosagem sérica de creatinina, AST/TGO e ALT/TGP. Periodicidade: trimestral - Beta HCG (mulheres em idade fértil). Periodicidade: Trimestral Para Alfaepoetina: - Hemograma Periodicidade: mensal nos primeiros seis meses. Após, trimestral.	D57.0 D57.1 D57.2 Hematologista Nefrologista (Exclusivamente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



	- informação sobre a presença de um dos critérios: presença de síndrome de hiper hemólise ou necessidade de mais de três concentrados de hemácias (CH) por ano para manter o nível de hemoglobina igual ou acima de 8,5 g/dL ou que apresente uma redução igual ou maior que 1,5 g/dL da sua hemoglobina basal documentado por exame.		
DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM OUTRAS DOENÇAS (MS) Filgrastim 300mcg injetável F/A Imunoglobulina humana: frasco com 2,5g, 5g.	1. Idade inferior ou igual a 12 anos; 2. Confirmação do diagnóstico de infecção pelo HIV através de: 2.1. <u>Crianças com idade < 18 meses</u>: quantificação do RNA viral plasmático e detecção do DNA pró-viral e carga viral entre 1 e 6 meses devida, sendo um destes após o quarto mês de vida; 2.2- Crianças com idade > 18 meses: teste de triagem (ELISA) para detecção de anti-HIV 1 e anti-HIV 2 e pelo menos um teste confirmatório (IMUNOBLOT ou WESTERN BLOT) ou dois testes rápidos; 3. Para HIV: laudo médico relatando ocorrência de infecções recorrentes; 4. Para púrpura trombocitopênica: laudo médico confirmando o diagnóstico de púrpura trombocitopênica associada ao HIV.	- Creatinina, TGO e TGP. Periodicidade: Semestral.	B20.0 – B20.1 B20.2 – B20.3 B20.4 – B20.5 B20.6 – B20.7 B20.8 – B20.9 B22.0 – B22.1 B22.2 - B22.7 B23.0 – B23.1 B23.2 – B23.8 B24 Pediatra ou Infectologista (Preferencialmente) Caso Especial: Não consta PCDT específico. Estes Medicamentos estão previstos em outros protocolos, mas que ao ser consequência do HIV, a GEAF parametriza de forma segregada. Tais pacientes são atendidos normalmente em Serviço Assistência Especializados em HIV.
DPOC (Protocolo MS) Budesonida 200 mcg cáps inal ou pó para inalação Budesonida 400 mcg cáps para inalação Fenoterol 100 mcg/dose sol aerossol (indisponível: atualmente sem demanda) Formoterol 12 mcg cáps ou pó para inalação Formoterol + budesonida 6+200 mcg e 12+400 mcg cáps ou pó para inalação	Exigido para comprovação diagnóstica (1ª solicitação): Formulário para solicitação de medicamento para tratamento de DPOC Espirometria (PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR) dentro dos critérios de qualidade das diretrizes brasileiras de função pulmonar da SBPT (validade 12 meses); Se associação LABA + LAMA + ICS, acrescentar: Hemograma (validade 3 meses).	- Relato médico em LME ou em laudo médico separado informando parâmetros clínicos: escala de dispnéia (mMRC ou CAT) e frequência e gravidade das exacerbações. Periodicidade: Semestral. - Para Budesonida, Formoterol + Budesonida e associação LABA + LAMA + ICS: Hemograma. Periodicidade: Semestral	J44.0 J44.1 J44.8 Para associação LABA + LAMA ou LABA + LAMA + ICS Pneumologista (exclusivamente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



<u>Associação LABA + LAMA:</u> Umeclidínio + Vilanterol (62,5 + 25) mcg pó para inalação Tiotrópio + Olodaterol (2,5+2,5) mcg sol para inalação <u>Associação LABA + LAMA + ICS:</u> Furoato de Fluticasona + Brometo de Umeclidínio + Trifenatato de Vilanterol (100 mcg + 62,5 mcg + 25 mcg pó para inalação oral Dipropionato de Beclometasona + Fumarato de Formoterol di-hidratado + Brometo de Glicopirrônio 100 mcg + 6 mcg + 12,5 mcg solução aerossol para inalação oral Documentação para abertura	Exigido para substituição/troca de medicamentos: - Para todos: Formulário para solicitação de medicamento para tratamento de DPOC (link). - Para Tiotrópio + Olodaterol, acrescentar: Espirometria (PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR) dentro dos critérios de qualidade das diretrizes brasileiras de função pulmonar da SBPT* (validade 12 meses). - Para Associação LABA + LAMA + ICS, acrescentar: Espirometria (PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR) dentro dos critérios de qualidade das diretrizes brasileiras de função pulmonar da SBPT* (validade 12 meses); Hemograma completo (validade 3 meses). Atenção: Exames adicionais podem ser solicitados a critério da comissão avaliadora, como por exemplo: Dosagem de alfa-1-antitripsina; Exame de imagem do tórax. * Se não foi possível realizar o exame, justificar o(s) motivo(s) em laudo médico.		
--	--	--	--



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



DOR CRÔNICA (Protocolo MS) Gabapentina 300mg e 400mg caps. Codeína 3mg/ml sol. oral, 30mg e 60mg comp. Metadona 5mg e 10mg comp. Morfina 10mg e 30mg comp. Morfina 30, 60 e 100 mg liberação prolongada e 10mg/ml sol. Oral Naproxeno 500 mg comp. Documentação para abertura	Necessário para abertura e nas substituições de medicamentos: - Relato médico (em LME ou em laudo à parte) informando: * os medicamentos previamente utilizados para alívio da dor e suas respectivas doses e tempo de uso de cada um; * Localização, duração, intensidade e tipo de Dor (dor nociceptiva, neuropática, nociplástica ou mista). Preferencialmente, por meio de escalas que melhor se adapte ao paciente descritas no apêndice A do PCDT-MS Para Naproxeno (acrescentar): - Relato médico em LME informando diagnóstico de Osteoartrite de joelho e/ou de quadril. * Validade 90 dias.	- Relato médico em LME informando a evolução clínica do paciente. Periodicidade: Semestral - Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP, creatinina, uréia, sódio, potássio, colesterol total e frações, triglicérides. Periodicidade: anual.	R52.1 e R52.2 (todos exceto Naproxeno) M16 / M16.0 M16.1 / M16.4 M16.5 / M16.6 M16.7 / M16.9 M17 / M17.0 M17.1 / M17.2 M17.3 / M17.4 M17.5 / M17.9 (Somente Naproxeno) PCDT
DOR CRÔNICA (Critério de Uso – Estadual) Tramadol 50mg caps. (Acima de 16 anos)	- Relato médico (em LME ou em laudo à parte) informando os medicamentos previamente utilizados para alívio da dor e suas respectivas doses e tempo de uso de cada um. - Escalas preenchidas de Dor LANSS (classificação da dor de predomínio nociceptivo, neuropático ou misto) e de EVA (intensidade da dor). * Validade 90 dias.	- Relato médico em LME informando a evolução clínica do paciente. Periodicidade: Semestral	M15.3 / M19.9 M18.9 / M18.2 M19.1 / M18.0 M19.0 / M25.5 M79.6 / M54.5 M54.6 / R52.9 M54.9 / M43.9 M53.9 / M79.0 Protocolo Estadual
ENDOMETRIOSE (Protocolo MS) Danazol 100mg cáps. Goserrelina 3,6mg e 10,8mg injetável Leuprorrelina 3,75mg Triptorrelina 3,75mg e 11,25mg injetável Documentação para abertura	- Relato médico com anamnese, incluindo avaliação do histórico clínico e familiar e exame físico, e descrição do tratamento prévio com contraceptivos orais combinados ou progestágenos (validade: 3 meses). - Exame de imagem que comprove o diagnóstico: Ultrassom transvaginal ou ressonância magnética ou Laparoscopia com biópsia ou laudo histopatológico (sem validade). Para Danazol, acrescentar: - Contagem de plaquetas, AST/TGO, ALT/TGP e creatinina (validade: 3 meses).	Para Danazol: - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP e creatinina. Periodicidade: Semestral.	N80.0 N80.1 N80.2 N80.3 N80.4 N80.5 N80.8 Ginecologista Obstetra (Preferencialmente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



ENXAQUECA (Critério de uso – Estadual) Topiramato 25mg, 50mg e 100mg comp.	- Paciente maior de 18 anos; - Apresentação do Diário de Cefaléia que caracterize padrão de Enxaqueca Crônica; - Laudo médico relatando ser o paciente portador de enxaqueca crônica refratária ou à terapia de primeira linha (ex: antidepressivos tricíclicos, beta-bloqueadores, bloqueador de canal de cálcio e anticonvulsivantes). * Validade 90 dias.	- Apresentação de diário de cefaléia e laudo médico relatando resposta, pelo menos parcial, ao tratamento realizado. Periodicidade: Trimestral.	G43 G43.0 G43.1 G43.3 G43.9 Neurologista Protocolo Estadual
EPILEPSIA (Protocolo MS) Clobazam 10mg Clobazam 20mg comp. Gabapentina 300mg e 400mg cáps. Etossuximida 50mg/ml xarope frasco 120mL Topiramato 25mg, 50mg e 100mg comp. Lamotrigina 25mg, 50mg e 100mg comp. Levetiracetam 250mg, 500mg, 750mg e 1000mg comp. Levetiracetam 100 mg /ml solução oral (frasco de 100ml ou de 150 ml) Primidona 100mg comp. Vigabatrina 500mg comp. Documentação para abertura	- Diário de registro de crises (validade 90 dias)	- Diário de registros de crises. Periodicidade: Semestral	G40.0/ G40.1/ G40.2 G40.3/ G40.4/ G40.5/ G40.6/ G40.7/ G40.8 Neurologista Psiquiatra Geriatra (Preferencialmente) Exige especialidades de acordo com a clínica do paciente: Clínicos gerais, pediatras e médicos da família: podem controlar com monoterapia as crises epilépticas de 50% dos pacientes; Neurologistas e neurologistas pediátricos: podem controlar mais 20% dos pacientes; Epileptologistas, neurocirurgiões e equipe: avaliação para confirmação diagnóstica e tratamento cirúrgico de epilepsia; Neurologista pediátrico, neurologista, pediatra, nutrólogo, nutricionista: avaliação para confirmação diagnóstica e possibilidade de tratamento com a dieta cetogênica. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



EPILEPSIAS REFRATÁRIAS ÀS TERAPIAS DISPONÍVEIS NO SUS PARA SÍNDROME DE DRAVET, LENNOX-GASTAUT E NO COMPLEXO DE ESCLEROSE TUBEROSA (Protocolo Estadual) Disponível: Canabidiol (CBD) 200mg/mL- frasco 30 ml (idade acima de 2 anos) Disponibilidade conforme Nota Técnica Documentação para abertura	- Formulário para solicitação e monitorização do uso de produtos de cannabis no tratamento de síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e no complexo de esclerose; - Relato médico (LME ou em laudo à parte) com descrição detalhada das crises e histórico médico, e do tratamento medicamentoso realizado; - Diário de crises (validade 90 dias). - Hemograma, creatinina, cálcio, sódio, potássio, magnésio, ALT/TGP e AST/TGO (validade 3 meses). - Exames de imagem (sem validade): - o Laudo de Eletroencefalograma compatível com achados com síndrome - o Lennox-Gastaut ou síndrome de Dravet; OU - o Laudo de Tomografia Computadorizada de Crânio ou de Ressonância Magnética de Encéfalo com laudo, em casos de Complexo da Esclerose Tuberosa.	- Relato médico quanto à tolerabilidade do tratamento, especialmente quanto a presença de efeitos adversos cognitivos e comportamentais. Periodicidade: Semestral - Formulário para solicitação e monitorização do uso de produtos de cannabis no tratamento de síndrome de dravet, lennox-gastaut e no complexo de esclerose Periodicidade: Semestral - Diário de registros de crises. Periodicidade: Semestral - Hemograma, creatinina, cálcio, sódio, potássio, magnésio, ALT/TGP e AST/TGO; Periodicidade: Semestral	G40.4 Q85.1 Neurologista, neuropediatra ou neurocirurgião (Exclusivamente) Protocolo Estadual
ESCLEROSE SISTÊMICA (Protocolo MS) Azatioprina 50mg comp. Ciclofosfamida 50mg drágea Metotrexato 2,5 mg comp e 25 mg/ml sol.inj. Em ampola de 2ml Sildenafil 25mg e 50mg comp. Documentação para abertura	Para todos: - Laudo médico informando o acometimento visceral predominante e a estratégia terapêutica definida de acordo com o acometimento visceral predominante; (validade 90 dias) - Autoanticorpos específicos para ES; (sem validade); - Hemograma completo (validade 90 dias). Para Azatioprina, acrescentar: - AST/TGO e ALT/TGP (validade 90 dias). Para Ciclofosfamida, acrescentar: - AST/TGO, ALT/TGP e creatinina (validade 90 dias). Para Metotrexato, acrescentar: - AST/TGO, ALT/TGP e creatinina (validade 90 dias). - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil.	Para Azatioprina: - Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP. Periodicidade: Trimestral Para Ciclofosfamida e Metotrexato: - hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP e creatinina. Periodicidade: Trimestral.	M34.0 M34.1 M34.8 Reumatologista Pneumologista (Preferencialmente) Recomenda-se a constituição de um centro de referência para avaliação, acompanhamento e administração de imunossupressores em casos especiais de ES juvenil. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA – ELA (Protocolo MS) Riluzol 50mg comp. Documentação para abertura	- Eletroneuromiografia dos 4 membros (validade 24 meses); - Hemograma completo; Ureia; Creatinina; TGO; TGP e Protrombina (validade 90 dias); - βHcG para mulheres em idade fértil (validade 1 mês) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade);	- Hemograma completo; - TGO/TGP. Periodicidade: Mensal nos primeiros 3 meses de tratamento, e após, trimestral.	G12.2 Neurologista (Preferencialmente). PCDT
ESCLEROSE MÚLTIPLA (Protocolo MS) Alentuzumabe injetável, 12mg F/A (18 anos) Azatioprina 50mg comp. Betainterferona 1A 6.000.000UI (22mcg) e (30mcg) e de 12.000.000UI (44mcg) ser. ou F/A Betainterferona 1B 9.600.000UI (300mcg) F/A Cladribina 10mg comp. Fingolimode 0,5 mg comp. (18 anos) Fumarato de Dimetila 120mg e 240mg comp (18 anos) Glatirâmer 40mg (seringa preenchida) Natalizumabe 300mg F/A (18 anos) Teriflunomida 14mg comp (18 anos) Documentação para abertura	Para TODOS: - Relato médico comprovando o diagnóstico utilizados os critérios de McDonald de 2017 preconizado no PCDT-MS. - Exigido uma única vez para abertura de processo, não necessário para substituição/troca de medicamentos: - o Ressonância magnética do crânio (validade 2 anos); - o Anti-HIV, VDRL e dosagem sérica de Vit B12 (validade 3 meses). - o Exceto para acetato de glatirâmer e betainterferonas: ▪ PPD ou IGRA (validade 1 ano); ▪ Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano). ▪ HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano); ▪ Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. - Necessário para abertura e na substituição/troca de medicamentos: - o Hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP, gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas (validade 3 meses); - o Valor da Escala EDSS (Escala Expandida do Estado de Disfunção). Para Alentuzumabe, acrescentar: - Relato médico documentando o diagnóstico de EMRR classificada como de alta atividade e informando ocorrência de falha ou contraindicação ao uso de Cladribina e ausência de contraindicações ao uso do Alentuzumabe (validade 3 meses); - Laudo de exame de ressonância magnética do crânio (validade 2 anos); - Creatinina sérica, exames de urina e TSH (validade 3 meses);	Para TODOS: - Taxa de surtos; - Valor da Escala EDSS; - Relato médico sobre a ocorrência de eventos adversos Periodicidade: semestral Para Azatioprina: - Hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP, gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas. Periodicidade: Aos 30 e 180 dias de tratamento, e após, semestral. Para Betainterferonas: - Hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP, fosfatase alcalina, bilirrubinas e TSH Periodicidade: Aos 30, 60 e 180 dias de tratamento, e após, semestral. Para Fumarato de Dimetila, Natalizumabe e Teriflunomida: - Hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP, fosfatase alcalina e bilirrubinas Periodicidade: Aos 30, 60 e 180 dias de tratamento, e após, semestral. Para Fingolimode: - Hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP, fosfatase alcalina e bilirrubinas Periodicidade: Aos 30, 60 e 180 dias de tratamento, e após, semestral. - Se o paciente for diabético, ou tiver uveíte prévia: avaliação oftalmológica Periodicidade: anualmente.	G35 Neurologista (Exclusivamente) Devem ser atendidos em serviços especializados. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

	Para Betainterferonas, acrescentar: - TSH (validade 3 meses). Para Cladribina, acrescentar: - relato médico documentando o diagnóstico de EMRR classificada como de alta atividade e informando ocorrência de falha ou contraindicação ao uso de Natalizumabe (validade 3 meses); - Laudo de exame de ressonância magnética do crânio (validade 2 anos); - Hemograma (validade 3 meses); - Valor do Clearance de Creatinina estimado com descrição da fórmula utilizada acompanhado da cópia do exame de creatinina sérica ou exame de Clearance de creatinina (validade 3 meses). Para Fingolimode, acrescentar: - Relato médico justificando falha terapêutica (definido conforme PCDT-MS) ou intolerância ou reações adversas ou falta de adesão à terapia de 1ª linha (Betainterferonas, Glatirâmer ou Teriflunomida ou Fumarato de Dimetila) E informando a ausência de contraindicação ao uso do fingolimode; E que o paciente não apresenta contra-indicação oftalmológica (validade 3 meses). Para Natalizumabe, acrescentar: - Relato médico informando a ausência de contraindicação ao uso do Natalizumabe (validade 3 meses), associado a uma das opções abaixo: Opção 1: se EMRR classificada como de alta atividade: o Relato médico documentado este diagnóstico; (validade 3 meses); o Laudo de exame de ressonância magnética do crânio; (validade 2 anos). Opção 2: se EMRR classificada de baixa ou moderada atividade: o Relato médico documentando este diagnóstico e informando ocorrência de falha ou contraindicação ao uso de fingolimode (validade 3 meses); o Laudo de exame de ressonância magnética do crânio (validade 2 anos).	Para Cladribina: - Hemograma completo Periodicidade: 30 dias antes do início do 2º ciclo anual de tratamento Para Alentuzumabe: - Hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, Creatinina sérica, Exame de urina, TSH Periodicidade: 30 dias antes do início do ciclo anual de tratamento.	
--	---	--	--



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



ESPASTICIDADE (Protocolo MS) Toxina Botulínica tipo A 100UI F/A Toxina Botulínica tipo A 500UI F/A Documentação de abertura	- βHcG para mulheres em idade fértil (validade 1 mês) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade); - Relato médico indicando comprometimento funcional, dor ou risco de estabelecimento de deformidades osteomusculoarticulares (validade 3 meses); - Avaliação do tônus muscular segundo a Escala de Ashworth Modificada (EAM).	-	G04.1/ G80.0 / G80.1 / G80.2 G81.1/ G82.1 / G82.4/ I69.0 / I69.1 / I69.2/ I69.3 / I69.4 / I69.8 T90.5 / T90.8 PCDT
ESPONDILITE ANCILOSANTE (Protocolo MS) Adalimumabe 40mg injetável Certolizumabe pegol 200mg/mL injetável (Acima de 18 anos) Etanercepte 25mg (Abaixo de 18 anos) Etanercepte 50mg injetável (Acima de 18 anos) Golimumabe 50mg injetável (Acima de 18 anos) Infliximabe 10mg/ml injetável Metotrexato 25mg/ml solução injetável e 2,5mg comprimido Naproxeno 500mg comprimido Secuquinumabe 150 mg/mL injetável (Acima de 18 anos) Sulfassalazina 500mg comprimido Documentação para abertura	Para Todos: - Exigido uma única vez na abertura de processo, não necessário para substituição de medicamentos: - o Laudo de imagem (Raio-X ou Ressonância Magnética) da(s) área(s) afetada(s) (validade 2 anos); - Necessário para abertura e nas substituições de medicamentos: - o Relato médico contendo valor do índice composto de atividade de doença (BASDAI ou ASDAS) (validade 3 meses); - o Velocidade de hemossedimentação (VHS), Proteína C Reativa, Hemograma completo, creatinina, AST/TGO, ALT/TGP (validade 3 meses). Para Metotrexato, acrescentar: - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Adalimumabe, Certolizumabe pegol, Etanercepte, Golimumabe, Infliximabe e Secuquinumabe, acrescentar: - Exigido somente uma vez no início de qualquer um desses medicamentos, não necessário para substituição: - o PPD ou IGRA (validade 1 ano); - o Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano); - o HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano); - o Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil.	Para todos: - Valor de BASDAI ou ASDAS; Periodicidade: Trimestral - Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP Periodicidade: Trimestral Para Metotrexato e Naproxeno: - Creatinina. Periodicidade: Trimestral. Para Adalimumabe, Certolizumabe pegol, Etanercepte, Golimumabe, Infliximabe e Secuquinumabe: - Hemograma, TGO, TGP. Periodicidade: Trimestral	M45 M46.8 Reumatologista (Exclusivamente) Devem ser atendidos por equipe em serviço especializado, que conte com reumatologista. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



ESQUIZOFRENIA (Protocolo MS) Clozapina 25mg e 100mg comp. Olanzapina 5mg e 10mg comp. Quetiapina 25mg, 100mg, 200mg e 300mg comp. Risperidona 1mg e 2mg comp. Ziprasidona 40mg e 80mg comp. Documentação de abertura	- Dosagens de colesterol total e frações, triglicerídios e glicemia de jejum – (validade 3 meses) Para Clozapina, acrescentar: - Hemograma completo (validade 30 dias).	Para Todos: - Dosagens de colesterol total e frações, triglicerídios e glicemia de jejum. Periodicidade: Anual. Só para Clozapina: - Hemograma completo. Periodicidade: Mensal.	F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.4 F20.5 F20.6 F20.8 Psiquiatra Médico do Programas de Saúde Mental do SUS (Exclusivamente) Casos especiais: Geriatra: Somente para idosos com Doença de Alzheimer Neurologista: pacientes epiléticos que apresentam comorbidades: alteração de comportamento, agressividade e alucinações. PCDT



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



ESTRATÉGIAS PARA ATENUAR A PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA Dapagliflozina 10mg comp Documentação de abertura	- Relato médico informando: ○ O estágio da DRC que o paciente se encontra; ○ Se paciente é diabético ou não; ○ O tratamento medicamentoso atualmente em uso descrito no próprio LME ou em laudo médico à parte; (validade 3 meses). - Creatinina sérica (validade 3 meses); - Para pacientes não diabéticos, acrescentar razão Albumina/Creatinina (RAC) urinária (validade 3 meses).	- Relato médico informando o estágio da DRC que o paciente se encontra. Periodicidade: semestral. - EAS, Creatinina sérica, Potássio sérico e RAC urinária. Periodicidade: Anual (a depender da clínica, pode-se solicitar exames complementares para monitorização).	N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 PCDT
FENILCETONÚRIA (Protocolo MS) Complemento alimentar isento de fenilalanina Sapropterina 100mg compr. (Somente sexo feminino)	- Dosagem sérica de Fenilalanina (se entre 8-10 mg/dl, apresentar 3 exames semanais consecutivos) - (sem validade) Para dispensação de Sapropterina para realização do Teste de responsividade, acrescentar: ▪ Relato médico informando diagnóstico de Fenilcetonúria (clássica ou leve) ou hiperfenilalaninemia não-FNC e se paciente está em período gestacional ou não (validade 30 dias). Para dispensação de Sapropterina durante o período periconcepcional e gestação, acrescentar: ▪ Laudo RESPONSIVO ao teste de responsividade à Sapropterina sapropterina (sem validade); ▪ Beta HCG ou relato médico que paciente está em período periconcepcional (validade 30 dias);	- Dosagem de Fenilalanina sérica: Periodicidade: trimestral (solicitar a cada três meses, os três últimos meses consecutivos)	E70.0 E70.1 PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

FIBRILAÇÃO ATRIAL NÃO VALVAR (Critério de Uso - Estadual) Etexilato de Dabigatрана 110mg e 150mg cápsula Rivaroxabana 15 e 20mg compr. Documentação para abertura	- Exame complementar laudado que documente o diagnóstico: eletrocardiograma ou holter.ou teste ergométrico (sem validade). - Apresentação da Escala de CHA2DS2-VASc com resultado maior ou igual a 2 (sem validade). - Creatinina sérica ou clearance de creatinina (validade 3 meses).	- Creatinina sérica ou clearance de creatinina. Periodicidade: semestral. Obs 1.: Para pacientes em uso de Dabigatрана, o clearance de creatinina (CICr) deve estar maior que 30ml/min. Obs 2.: Para pacientes em uso de Rivaroxabana, o CICr deve estar maior que 15ml/min. A dose recomendada é 20 mg 1x/dia. Para pacientes com função renal com alteração moderada (Clearance de Creatinina entre 15 a 50 ml/min) a dose recomendada é 15 mg 1x/dia.	I48 I63.1 Neurologista Cardiologista (Exclusivamente) Rivaroxabana Critérios de Utilização na Fibrilação Atrial Dabigatрана - Critérios de utilização na fibrilação atrial nao valvar
FIBROSE CÍSTICA (Protocolo MS) Alfadornase 2,5mg solução injetável * Ellexacaptor 50 mg / Tezacaptor 25 mg / Ivacaptor 37,5 mg + Ivacaptor 75 mg comp.* (Idade entre 6 e 11 anos) Ellexacaptor 100 mg / Tezacaptor 50 mg / Ivacaptor 75 mg + Ivacaptor 150 mg comp.* (acima de 6 anos) Ivacaptor 150mg comp. (acima 6 anos) Pancreatina 10.000UI e 25.000UI cáps. Tobramicina 300mg solução inalatória * *medicamento dispensado somente nos centros de referências estaduais em Fibrose Cística (HINSG e Dório Silva) Documentação para abertura	Para todos: - Laudo emitido pelo Serviço de Referência Estadual (HINSG ou Hospital Dório Silva) documentando o diagnóstico de Fibrose Cística (sem validade). Para Alfadornase, acrescentar: - Relato médico descrevendo os sintomas respiratórios do paciente ou exame de radiológico com evidências de doença pulmonar precoce (validade 3 meses). Para Pancreatina, acrescentar: - Relato médico descrevendo os sinais clínicos de má-absorção do paciente (validade 3 meses). Para Ivacaptor, acrescentar: - Cópia de exame de uma das seguintes mutações de gating (classe III) no gene CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N ou S549R (sem validade). Para Ellexacaptor/Tezacaptor/Ivacaptor, acrescentar: - Relato médico em LME informando dados antropométricos (peso, altura e Índice de Massa Corporal - IMC); o número de exacerbações pulmonares e hospitalizações no último ano e medida da pressão arterial (validade 3 meses); - Cópia de exame de mutação genética F508del no gene CFTR (sem validade); - Dosagem quantitativa de cloreto no suor atualizado (sem validade – no diagnóstico); - Hemograma, fosfatase alcalina (FA), gama GT, bilirrubina,	- Relato médico informando a evolução clínica e os dados antropométricos atualizados (peso, altura e Índice de Massa Corporal - IMC) em LME. Periodicidade: semestral. Para Ellexacaptor/Tezacaptor/Ivacaptor e ivacaptor, acrescentar: - Hemograma, fosfatase alcalina (FA), gama GT, bilirrubina, ALT/TGP, AST/TGO, CPK, determinação de tempo e atividade da protrombina. Periodicidade: no primeiro mês e trimestral no primeiro ano. Após, anual. - Espirometria Periodicidade: anual - Relato médico informando a resposta terapêutica quanto aos objetivos de eficácia preconizados no PCDT-MS, quais sejam: - Estabilização ou aumento do VEF1 em relação ao valor prévio; - Redução do número de exacerbações pulmonares e hospitalizações em relação ao ano anterior; - Melhora ou estabilização dos sintomas respiratórios; - Melhora do estado nutricional, medido	E84.0 (exceto pancreatina) E84.1 (Exceto alfadornase e Tobramicina) E84.8 (para todos) O PCDT recomenda que a prescrição seja realizada por médico vinculado a Centro de Referência de FC. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



	ALT/TGP, AST/TGO, creatinofosfoquinase (CPK), determinação de tempo e atividade da protrombina (validade 3 meses); - Espirometria (validade 6 meses); - Laudo de cultura de secreção respiratória (validade 3 meses); - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Tobramicina, acrescentar: - Laudo de cultura de secreção respiratória colonizada Pseudomonas aeruginosa (validade 3 meses).	pelo valor IMC adequado à idade, exceto se houver outra explicação; - Redução da concentração do cloreto no suor igual ou superior a 20% ou 20mmol/L em relação ao teste pré-modulador. Periodicidade: 12º mês de uso - Dosagem quantitativa de cloreto no suor Periodicidade: Entre o 3º e 12º mês de uso.	
FIBROSE CÍSTICA (Pacientes do HINSG e DÓRIO SILVA – Estado) Budesonida 200mcg cáps inal Formoterol + budesonida 6+200mcg e 12+400mcg cáps inal Insulina glargina 100UI/ML frasco 10ml e refil 3ml Omalizumabe 150mg injetável Salmeterol+fluticasona 125mcg+25mcg e 250mcg+50mcg	-	-	E84.0 E84.1 E84.8 E84.9
GLAUCOMA (Protocolo MS) Acetazolamida 250mg comprimido Bimatoprost 0,3mg/mL sol oftálmica Brimonidina 2mg/mL sol oftálmica Brinzolamida 10mg/mL sol oftálmica Dorzolamida 20mg/mL sol oftálmica Latanoprost 0,05mg/mL sol oftálmica Pilocarpina 20mg/mL sol oftálmica Timolol 5mg/mL sol oftálmica Travoprost 0,04mg/mL sol oftálmica Documentação para abertura	Para abertura do processo: - Formulário para solicitação de medicamentos para o tratamento de glaucoma preenchido pelo médico assistente (validade 3 meses) - Campimetria (validade 1 ano); - Avaliação de fundo de olho (mapeamento de retina) - (validade 1 ano). - Para substituição de medicamentos, necessário apenas: - Formulário para solicitação de medicamentos para o tratamento de glaucoma preenchido pelo médico assistente justificando a substituição (validade 3 meses); - Exames de monitorização anexados no processo em suas respectivas periodicidades	- Medida da PIO basal. Periodicidade: semestral. - Campimetria. Periodicidade: anual.	H40.1 H40.2 H40.3 H40.4 H40.5 H40.6 H40.8 Q15.0 Oftalmologista (Exclusivamente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026




SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA (Protocolo MS) Eculizumabe 10mg/mL injetável F/A com 30 mL (idade acima de 14 anos) Documentação para abertura	- Relato médico descrevendo a história clínica recente e a história transfusional nos últimos seis meses (validade 3 meses); - Cópia do exame de pesquisa de clone por citometria de fluxo (sem validade); - Cópia de exame lactato desidrogenase (validade 3 meses); - Pelo menos, um dos seguintes exames, a depender da clínica: Exame de imagem evidenciando evento tromboembólico com necessidade de anticoagulação terapêutica (sem validade); ou Cópias de hemograma demonstrando anemia crônica (sem validade); ou Cópia de ecocardiograma com PSAP > 35 (sem validade); ou Cópia do exame de taxa de filtração glomerular (resultado do clearance de creatinina ou calculável pela creatinina sérica) (validade 3 meses); ou Dosagem de B-hCG sérico ou ultrassonografia transvaginal ou pélvica (atual) (validade 3 meses). - Teste direto de antiglobulina (teste de Coombs direto) (validade 3 meses); - Exames laboratoriais: Hemograma completo e reticulócitos, Índice de saturação de Transferrina, ferritina sérica, ureia e creatinina (validade 3 meses); - Questionário de avaliação da qualidade de vida (validade 3 meses).	- Relato médico descrevendo a evolução clínica. Periodicidade: trimestral. - Cópia de exame lactato desidrogenase, hemograma completo e reticulócito Periodicidade: trimestral. - Teste direto de antiglobulina (teste de Coombs direto), Índice de saturação de Transferrina, ferritina sérica, uréia e creatinina. Periodicidade: semestral. - Questionário de avaliação da qualidade de vida. Periodicidade: semestral.	D59.5 Hematologista (Exclusivamente) PCDT
HEPATITE AUTOIMUNE (Protocolo MS) Azatioprina 50mg comp. Documentação para abertura	Relato médico em LME com descrição se há presença de sintomas constitucionais incapacitantes ou cirrose com atividade inflamatória e a pontuação obtida no escore de diagnóstico, sendo: - Para pacientes sem outras doenças autoimunes concomitantes, informar a pontuação obtida no ERDHA1; ou - Para pacientes com doenças autoimunes, informar a pontuação obtida nos critérios simplificados para	- Hemograma Completo, ALT/TGP, AST/TGO, Bilirrubina, Gama-GT. Periodicidade: Mensal, nos primeiros 6 meses de tratamento e, após, trimestralmente.	K75.4 PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



	diagnóstico de HAI. Exames sanguíneos utilizados para a pontuação obtida em seu respectivo escore de diagnóstico; - ALT/TGP, AST/TGO e fosfatase alcalina (validade 3 meses); - Gamaglobulina ou IgG (validade 1 ano); - FAN/anti-músculo liso ou anti-LKM-1 (validade 1 ano); - Sorologias de hepatites virais: anti-HAV IgM; HBsAg; Anti-HBc total; Anti-HCV e HCV-RNA qualitativo (validade 1 ano); - Biópsia hepática (sem validade).		
HEMANGIOMA INFANTIL (Protocolo MS) Alfainterferona 2b 3.000.000 UI, 5.000.000 UI e 10.000.000 UI Documentação para abertura	- Relato médico detalhado dos sinais e sintomas e tratamentos prévios; - Exames laboratoriais: TSH, ALT/TGP, AST/TGO, TAP (validade 3 meses).	- Exames laboratoriais: hemograma completo, ALT/TGP, AST/TGO, TSH (somente para casos de hipotireoidismo). Periodicidade: Trimestral.	D18.0 Pediatra (Preferencialmente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



HIDRADENITE SUPURATIVA (Protocolo MS) Adalimumabe 40mg injetável – seringa preenchida (Acima de 18 anos) Documentação para abertura	- Relato médico informando a história e a localização anatômica das lesões, o estágio evolutivo da doença em que o paciente se encontra utilizando a classificação de <i>Hurley</i> e os tratamentos prévios realizados (validade 3 meses); <u>e</u> - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, creatinina e ureia (validade 3 meses); <u>e</u> - PPD ou IGRA (validade 1 ano); <u>e</u> - HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano); <u>e</u> - Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano); <u>e</u> - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil.	Para todos: - Laudo médico informando a resposta clínica ao tratamento utilizando o valor da <i>HiSCR</i> (<i>Hidradenitis Suppurativa Clinical Response</i>) Periodicidade: trimestral. - Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP. Periodicidade: Trimestral	L73.2 Dermatologista (Preferencialmente). PCDT
HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA (Protocolo MS) Fludrocortisona 0,1mg comp. Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	- Dosagem de 17-OH-progesterona em amostra de sangue periférico (basal ou após estímulo com 250mg de ACTH) (validade 3 meses); - Dosagem de sódio e potássio séricos <u>OU</u> dosagem renina plasmática e aldosterona (validade 3 meses).	- Dosagem de renina plasmática, sódio e potássio séricos. Periodicidade: Trimestral até o 1º ano de vida, e após, semestral. - Registros das medidas de pressão arterial feitas a cada 2 semanas. Periodicidade: Trimestral.	E25.0 Endocrinologista (Preferencialmente) PCDT
HIPERPROLACTINEMIA (Protocolo MS) Cabergolina 0,5 mg comp. Bromocriptina 2,5mg comp. (Medicamento excluído do SUS, conforme Portaria SCTIE/MS nº 96, de 29/12/2025) Documentação para abertura	- Pesquisa de macroprolactina (validade 3 meses); - Dosagem de prolactina (validade 3 meses); - Ressonância magnética de sela turca, preferencialmente, <u>OU</u> tomografia computadorizada (validade 1 ano); - Dosagem de TSH, TGO e Creatinina (validade 3 meses); - βHcG para mulheres em idade fértil (validade 1 mês) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade); - Ecocardiografia transtorácica: obrigatório somente para os pacientes com doses altas de cabergolina (> 3 mg/dia ou 20 mg/semana) - (validade 6 meses).	- Dosagem de Prolactina. Periodicidade: Anual ou nos casos de mudança de dose. - Ressonância magnética de sela turca em pacientes com macroadenoma. Periodicidade: 3 meses após início do tratamento e posteriormente de acordo com evolução clínica	E22.1 Ginecologista Endocrinologista (Preferencialmente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR (Protocolo MS) Sildenafil 20 mg comp. Ambrisentana 5mg e 10mg comp. Bosentana 62,5mg e 125mg comp. Iloprost 10 mcg/mL solução para nebulização Selexipag 200mcg, 400mcg, 600mcg, 800mcg, 1000mcg, 1200mcg, 1400mcg e 1600mcg comp. Documentação para abertura	Para início de tratamento: - Cateterismo cardíaco direito com medida de pressão de átrio direito (AD) e de saturação venosa central (SVO₂) (validade 1 ano); - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP (validade 3 meses); - Laudo médico informando (validade 3 meses): - o Diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar com a classificação de <i>Danna Point</i>; - o Classe funcional NYHA/OMS do paciente; - o Estratificação de risco do paciente relatando o resultado do teste de caminhada de 6 minutos (TC6M); - o Tratamento prévios realizados e a resposta terapêutica. Para associação ou substituição de medicamentos: - Laudo médico informando (validade 3 meses): - o Classe funcional NYHA/OMS do paciente; Estratificação de risco do paciente relatando o resultado do teste de caminhada de 6 minutos (TC6M).	Para todos: - Descrição em LME da avaliação clínica do paciente, informando classe funcional NYHA/OMS e a estratificação de risco do paciente com o resultado do teste de caminhada de 6 minutos (TC6M). Periodicidade: Semestral. Somente para Ambrisentana e Bosentana: - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP. Periodicidade: Trimestral no primeiro ano, após semestral.	I27.0 I27.2 I27.8 Pneumologista (Preferencialmente) Devem ser atendidos em hospitais habilitados em Pneumologia PCDT
HIPOPARATIREOIDISMO (Protocolo MS) Calcitriol 0,25mcg cáps. Documentação para abertura	-Exames laboratoriais (validade 3 meses): - o Dosagem de cálcio total e albumina, <u>OU</u> cálcio iônico; - o PTH; - o Fósforo e magnésio; - o Creatinina e calciúria 24h; - o Taxa de filtração glomerular estimada ou clearance de creatinina; - Peso atual do paciente.	- Dosagem de cálcio total e albumina ou cálcio iônico, fósforo, calciúria em 24 horas, creatinúria/24 horas. Periodicidade: Mensal até normalização e após, semestral.	E20.0 / E20.1 E20.8 / E89.2 Endocrinologista (Exclusivamente) Deve ser realizado em serviços especializados de endocrinologia. PCDT
ICTIOSES HEREDITÁRIAS (Protocolo MS) Acitretina 10mg e 25mg cáps. Documentação para abertura	- Relato médico do quadro clínico cutâneo e manifestações extracutâneas (se houver) do paciente. (validade 3 meses). - Colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos e glicemia de jejum, ALT/TGP, AST/TGO e bilirrubinas. (validade 3 meses) - βHcG para mulheres em idade fértil (validade 1 mês) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade); - Para crianças: laudo de radiografia da coluna cervical e lombar, ossos longos, de mãos e punhos para idade óssea (validade 1 ano).	- Colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos e glicemia de jejum, ALT/TGP, AST/TGO e bilirrubinas. Periodicidade: no primeiro mês e trimestral. - Beta HCG atual em mulheres em idade fértil Periodicidade: Mensal.	Q80.0 / Q80.1/ Q80.2 Q80.3/ Q80.8/ Q80.9 Dermatologista (Preferencialmente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



	Atenção: Outros exames podem ser solicitados a critério da comissão avaliadora.		
IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA (Protocolo MS) Imunoglobulina humana: frasco com 2,5g, 5g. Imunodeficiencia Primaria	<u>Para todos os CIDs (validade 3 meses):</u> - Dosagem de IgG total, IgA, IgM; - Hemograma completo; - Uréia e Creatinina; - ALT, AST e Albumina sérica. <u>Incluir somente para o CID D80.3 (validade 3 meses):</u> - Subclasses de IgG. <u>Incluir somente para os CIDs D80.6 e D80.8:</u> - Dosagem das Isohemaglutininas Anti – A e Anti – B; - Dosagem dos anticorpos pós- vacinais: anti – tétano, anti – difteria, anti – rubéola, anti – hepatite B, anti– sarampo; - Dosagem de anticorpos anti-polissacárides do pneumococo (pré e pós vacinais).	- Hemograma, Uréia, Creatinina, ALT, AST, TP, Albumina e EAS. Periodicidade: Trimestral.	D80.0/ D80.1/ D80.3/ D80.5/ D80.6/ D80.7/ D80.8/ D81.0/ D81.1/ D81.2/ D81.3/ D81.4/ D81.5/ D81.6/ D81.7/ D81.8/ D82.0/ D82.1/ D83.0/ D83.2/ D83.8 Imunologista e Geneticista (Exclusivamente) Devem ser encaminhados a um Centro de Referência para avaliação e tratamento específicos com imunologista e geneticista. PCDT
IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE CARDÍACO (Protocolo MS) Azatioprina 50mg comp Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Everolimo 0,5mg, 0,75mg e 1mg comp Micofenolato de mofetila 500mg comp Micofenolato de sódio 180mg e 360mg comp Tacrolimo 1mg e 5mg caps Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	- Alta hospitalar ou Laudo médico contendo informação sobre o transplante cardíaco e o esquema de imunossupressor solicitado (indução, manutenção ou rejeição/resgaste) - Não são exigidos exames iniciais. **Para conversão de imunossupressor, laudo médico com justificativa.	Para Azatioprina e Micofenolato: - Hemograma completo Periodicidade: mensal nos primeiros 2 meses de uso, depois a cada alteração de dose ou a critério médico. - Amilase, ALT/TGP e AST/TGO Periodicidade: a critério médico. Para Ciclosporina: - Dosagem sérica de ciclosporina, potássio e creatinina. Periodicidade: a critério médico. Para Tacrolimo: - Dosagem sérica de tacrolimo, glicose e creatinina Periodicidade: a critério médico. Para Everolimo: - Dosagem sérica do medicamento em uso, hemograma, proteinúria e creatinina Periodicidade: a critério médico.	Z94.1 T86.2 Devem ser avaliados periodicamente em serviços habilitados pelo Ministério da Saúde, integrantes do Sistema Nacional de Transplantes PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE HEPÁTICO EM PEDIATRIA (Protocolo MS) Azatioprina 50 mg comp Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Everolimo 0,5mg, 0,75mg e 1mg comp. Micofenolato mofetila 500mg comp. Micofenolato de sódico 180mg e 360mg comp. Tacrolimo 1mg e 5mg cáps. Sirolimo 1mg e 2mg. Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	- Relato médico com comprovação de transplante hepático em pacientes até 18 anos (sem validade); - Resumo de alta hospitalar (validade 3 meses). Imunossupressão do transplante Hepático em Pediatria	Para Azatioprina: - Hemograma completo, ALT/TGP e AST/TGO. Periodicidade: na primeira semana e após a cada mudança de dose. Para Ciclosporina e Tacrolimo: - Dosagem sérica. Periodicidade: Mensal no primeiro ano, e após, trimestral.	T86.4 Z94.4 Gastroenterologista (Exclusivamente) Devem ser atendidos em serviços especializados em transplante hepático. PCDT
IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE HEPÁTICO EM ADULTOS (Protocolo MS) Azatioprina 50 mg comp Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Everolimo 0,5mg, 0,75mg e 1mg comp Micofenolato mofetila 500mg comp Micofenolato de sódico 180mg e 360mg comp Tacrolimo 1mg e 5mg cáps Documentação para abertura	- Relato médico com comprovação de transplante hepático em pacientes com idade superior a 18 anos (sem validade); - Resumo de alta hospitalar (validade 3 meses).	Para Ciclosporina, Everolimo e Tacrolimo: - Dosagem sérica do respectivo medicamento Periodicidade: quando houver ajuste de dose. Para Ciclosporina, Tacrolimo, Micofenolato de Mofetila, Micofenolato de Sódio e Everolimo: - Hemograma Completo, creatinina sérica, glicose, TGO, TGP, Fosfatase Alcalina, Bilirrubinas totais e frações, colesterol total e frações, Triglicerídeos, Sódio, Potássio, Periodicidade: a critério médico. Para: Azatioprina - Hemograma completo. Periodicidade: a critério médico. - Creatinina sérica, TGO, TGP, Gama-GT, Fosfatase Alcalina, Bilirrubinas totais e	T86.4 Z94.4 Gastroenterologista (Preferencialmente). PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



*Atualizado em 29/12/2025		frações. Periodicidade: a critério médico.	
IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE RENAL (Protocolo MS) Azatioprina 50mg comp Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Everolimo 0,5mg, 0,75mg e 1mg comp Micofenolato mofetila 500mg comp Micofenolato de sódio 180mg e 360mg comp Sirolimo: drágeas de 1 e 2mg Imunoglobulina humana: frascos de 2,5g, 5,0g Tacrolimo 1mg e 5mg cáps Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	- Não são exigidos exames iniciais. - Laudo médico ou LME contendo as seguintes informações do transplante renal – validade 90 dias: - o Se foi doador vivo relacionado ou não, ou doador falecido (com critério expandido ou não); - o HLA; - o Tempo de isquemia; - o Reatividade contra painel; - o Se paciente teve intercorrência no PO, como funcionamento tardio do enxerto, rejeição ou qualquer outra intercorrência; - o Se trata de retransplante. - Alta hospitalar. ** Para conversão de imunossupressor, laudo médico com justificativa e exames que comprovem diagnóstico.	Para Azatioprina - Hemograma completo Periodicidade: Mensal nos primeiros 2 meses de uso e depois a critério médico. - Creatinina sérica, Glicose, TGO, TGP, Fosfatase Alcalina, Bilirrubinas totais e frações, Colesterol Total, HDL, Triglicerídeos, Sódio, Potássio e Cloro. Periodicidade: a critério médico. Para Ciclosporina, Tacrolimo, Micofenolato de Mofetila, Micofenolato de Sódio, Sirolimo e Everolimo: - Hemograma Completo, creatinina sérica, glicose, TGO, TGP, Fosfatase Alcalina, Bilirrubinas totais e frações, colesterol total, HDL, Triglicerídeos, Sódio, Potássio, Cloro, Dosagem Sérica de Ciclosporina, Tacrolimo, Sirolimo e Everolimo. Periodicidade: a critério médico. Para Ciclosporina, Tacrolimo, Sirolimo e Everolimo: - Dosagem sérica do respectivo medicamento quando houver ajuste de dose. ** Para conversão de imunossupressor, laudo médico com justificativa e exames que comprovem diagnóstico.	Z94.0 T86.1 Nefrologista (Exclusivamente) Devem ser atendidos em serviços especializados, integrantes do Sistema Nacional de Transplantes. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



INSUFICIÊNCIA ADRENAL PRIMÁRIA - DOENÇA DE ADDISON (Protocolo MS) Fludrocortisona 0,1mg comp. Documentação para abertura	- Dosagem basal de Cortisol e de ACTH <u>ou</u> cortisol após teste de estímulo com 250µg de ACTH (intravenoso ou intramuscular) <u>ou</u> Dosagens séricas da Renina e da Aldosterona (validade: 3 meses).	- Dosagens séricas de renina, sódio e potássio. Periodicidade: Semestral. - Solicitar registros das medidas de pressão arterial. Periodicidade: Trimestral.	E27.1 E27.4 Endocrinologista (Preferencialmente) PCDT
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA Dapagliflozina 10mg comp Sacubitril Valsartana Sódica 50mg, 100mg e 200mg comprimido Documentação para abertura * Atualizado em 17/10/2024	- Relato do médico assistente informando: - Quadro clínico detalhado e classe funcional NYHA em que o paciente se encontra; - Tratamento prévio com descrição dos medicamentos utilizados (validade 3 meses). - Ecocardiograma transtorácico (validade: 12 meses para início de tratamento ou aos pacientes que estão em uso de comprimidos de Dapagliflozina ou sacubitril valsartana apresentar este exame previamente ao início de seu uso (sem validade)); Para sacubitril valsartana, acrescentar: - Dosagem do peptídeo natriurético do tipo B (BNP) ou da porção n-terminal do peptídeo natriurético tio B (NT-ProBNP) (sem validade);	- Relato médico informando a evolução clínica do paciente em LME. Periodicidade: semestral.	I50.0 I50.1 I50.9 PCDT
INSUFICIÊNCIA PANCREÁTICA EXÓCRINA (Protocolo MS) Pancreatina 10.000 ou 25.000 UI cápsulas Documentação para abertura	- Diagnóstico laboratorial de Esteatorréia (3 meses validade): - teste de elastase pancreática fecal; ou gordura fecal positiva pela coloração de Sudan III ou dosagem da excreção fecal Associado a: - Exame de imagem com alterações condizentes com pancreatite crônica (sem validade): - Radiografia simples de abdome; ou Ultrassonografia de abdome; ou Ecoendoscopia; ou Tomografia computadorizada de abdome; ou Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPER); ou ressonância magnética de vias biliares. Exceção: - Em casos de câncer pancreático, somente: laudo médico associado a diagnóstico clínico de esteatorréia (sem validade). - Em casos de ressecções pancreáticas, somente: laudo	- Relato médico detalhando a evolução clínica e o Índice de Massa Corporal (IMC) em LME. Periodicidade: semestral.	K86.0 K86.1 K90.3 Gastroenterologista (Preferencialmente). PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



	cirúrgico ou cópia de exame de imagem, associado a diagnóstico clínico de esteatorréia (sem validade).		
INCONTINÊNCIA URINÁRIA (Mini-protocolo Estadual) Oxibutinina 5 mg comp. Oxibutinina 10 mg comp. Liberação prolongada Tolterodina 4 mg* (Registro descontinuado temporariamente na ANVISA - Nota Técnica)	- Laudo médico descrevendo a incontinência urinária decorrente de uma das doenças relacionadas no CID-10 aprovados (validade 90 dias); - Laudo médico descrevendo que foram adotadas as medidas recomendadas sobre o controle da ingestão de líquidos e sobre a terapia comportamental, que colaboram no processo terapêutico (validade 90 dias).	-	R32 N30.0 / N31.0 / N31.9 N32.0 / N33.0 / N39.0 Urologista Nefrologista (Preferencialmente) Protocolo Estadual
LEIOMIOMA DO ÚTERO (Protocolo MS) Gosserrelina 3,6mg injetável Gosserrelina 10,8 mg injetável Leuprorrelina 3,75 mg Triptorrelina 3,75mg e 11,25mg injetável Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	- Histerosalpingografia <u>OU</u> - Histeroscopia <u>OU</u> - Histerossonografia <u>OU</u> - Ultrassonografia (transabdominal ou transvaginal) <u>OU</u> - Tomografia computadorizada <u>OU</u> - Ressonância magnética <u>OU</u> - Laparoscopia (nos casos em que a imagem do leiomioma foi obtida por laparoscopia realizada por qualquer razão, não há necessidade de exame de imagem). *Validade 1 ano.	- Ultrassonografia e hemograma. Periodicidade: Trimestral.	D25.0 D25.1 D25.2 Ginecologista e Obstetra (Exclusivamente) Devem ser atendidos em serviços especializados em ginecologia. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

LINFANGIOLEIOMIOMATOSE Sirolimo 1mg e 2mg comp Documentação para abertura	- Relato médico (em LME ou em laudo à parte) do quadro clínico do paciente - Laudo de Tomografia computadorizada (TC) do Tórax (sem validade) - Espirometria dentro dos critérios de qualidade das Diretrizes brasileiras de função pulmonar da SBPT (Sem validade); - Pelo menos, um dos seguintes documentos/exames para confirmação diagnóstica: - Relato médico informando presença do complexo de esclerose tuberosa (sem validade) ou - Laudo de TC ou ressonância magnética de abdôme (sem validade); ou - Laudo de TC ou ressonância magnética de pelve (sem validade); ou - Exame Citopatológico positivo para células LAM ; ou - Exame histopatológico de material obtido por biópsia pulmonar (sem validade)	- Dosagem sérica do medicamento. Periodicidade: Semestral ou quando houver ajuste de dose - Colesterol total, HDL, triglicerídeos, proteinúria, ALT/TGP e AST/TGO. Periodicidade: anual.	J84.8 PCDT
LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (Protocolo MS) Azatioprina 50 mg comp. Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Danazol 100mg cáps. (Indisponível - Nota Técnica) Hidroxyclorequina 400 mg comp. Metotrexato 2,5 mg comp. e 25 mg/ml solução injetável Micofenolato de mofetila 500 mg comp. (somente para Nefrite Lúpica) Documentação para abertura	Para Todos: - Relato médico informando: ○ Pontuação obtida na ferramenta de avaliação de atividade da doença do paciente SLEDAI contendo a descrição dos órgãos e sistemas envolvidos; ○ Os medicamentos utilizados, tempo de uso e a evolução clínica durante sua utilização (validade 3 meses). - Exames: ○ FAN (sem validade) - Exigido somente uma única vez na abertura de processo, não necessário para substituição de medicamentos; ○ Hemograma completo, AST/TGO e ALT/TGP, creatinina, EAS, complemento C3 e C4 e anti-DNA nativo (validade 3 meses). ○ <u>Se LES + NEFRITE, acrescentar:</u> ▪ Urocultura, Proteinúria 24 hs, Albumina, sódio e potássio; (validade 3 meses)	Para todos: - Pontuação obtida na ferramenta de avaliação de atividade da doença do paciente SLEDAI contendo a descrição dos órgãos e sistemas envolvidos. Periodicidade: Semestral. - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, VHS, PCR, anti DNA nativo, EAS, creatina, complementos C3 e C4. Periodicidade: Trimestral nos primeiros 6 meses. Após, semestral. Para Ciclosporina, acrescentar: - Dosagem sérica de ciclosporina Periodicidade: Semestral. Para Ciclofosfamida, acrescentar: - Citologia da urina e exame citopatológico de colo uterino. Periodicidade: Anual. Para Danazol, acrescentar: - Colesterol total, HDL e triglicerídeos. Periodicidade: Trimestral nos primeiros 6 meses. Após, semestral.	L93.0 L93.1 M32.1 M32.8 Reumatologista (Preferencialmente) Os casos LES + NEFRITE poderão ser prescritos por Nefrologista. Casos especiais devem ser tratados por médicos qualificados, em serviço especializado. Gestantes, lactantes, crianças e pacientes com manifestações graves associadas ao LES também devem ser encaminhadas para serviço especializado. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



	▪ Biópsia renal (caso tenha sido realizado) (sem validade) ○ <u>Se LES + manifestação hematológica com anemia hemolítica, acrescentar:</u> • Teste de Coombs; (validade 3 meses) • Exames para comprovação de hemólise: Contagem de reticulócitos ou Dosagem de Desidrogenase láctica (DHL) ou de haptoglobina ou de Bilirrubina (total e frações); (validade 3 meses) ○ <u>Se LES + TROMBOSE:</u> ▪ Anticoagulante lúpico, VDRL, Anticardiolipina IgG e IgM, anti-beta2-glicoproteína1 (validade 3 meses) <u>Para Hidroxicloroquina, acrescentar:</u> - Avaliação oftalmológica (validade 1 ano). <u>Para Metotrexato, acrescentar:</u> - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil.	Para Hidroxicloroquina, acrescentar: - Avaliação oftalmológica. Periodicidade: Anual.	
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, DOENÇA DO ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO, MIELOMA MÚLTIPLO E SÍNDROME MIELODISPLÁSICA Talidomida 100 mg comp.	- Não é exigido LME; - Notificação de receita de talidomida; - Termo de responsabilidade / esclarecimento para mulheres com mais de 55 anos de idade ou para homens de qualquer idade <u>OU</u> Termo de responsabilidade / esclarecimento para pacientes do sexo feminino, menores de 55 anos de idade; - Laudo médico com história do paciente e os tratamentos que recebeu até o momento – validade 90 dias; - Dosagem de Beta-HCG ou urinário de alta sensibilidade, para mulheres na idade fértil (pacientes que se encontram entre a menarca e a menopausa) (Validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade).	- Documentos exigidos na RDC nº 11/2011.	M32/ L93.0/ L93.1 T86.0/ C90.0/D46.0 D46.1/ D46.4 Hematologista Reumatologista (Preferencialmente)

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

MIASTENIA GRAVIS (Protocolo MS) Azatioprina 50mg comp. Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Imunoglobulina Humana 2,5g, 5g F/A. Piridostigmina 60mg comp. Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	Para todos: - Relato em LME das manifestações clínicas compatíveis com MG; - Exames confirmatório de diagnóstico (sem data de validade): ▪ Laudo de Eletroencefalografia; ou ▪ Teste laboratorial de anticorpo anti-receptor de Acetilcolina Para Azatioprina, acrescentar: - Hemograma completo, AST/TGO e ALT/TGP (validade 3 meses) Para Ciclosporina, acrescentar: - Hemograma Completo, Creatinina e uréia (validade 3 meses) Para Imunoglobulina, acrescentar: - Relato médico em LME evidenciado que se trata de crise miastênica (tetraparesia flácida, disfagia e disfunção respiratória) (validade 90 dias). - Creatinina e uréia (validade 90 dias) - Dosagem sérica de IgA (validade 90 dias)	Para Azatioprina: Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP Periodicidade: Trimestral. Para Ciclosporina: - Nível sérico de ciclosporina. Periodicidade: Anual - Creatinina e uréia Periodicidade: Trimestral.	G70.0 G70.2 PCDT
MIOPATIAS INFLAMATÓRIAS (Protocolo MS) Azatioprina 50mg comp Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Hidroxiquina 400mg comp. Imunoglobulina humana: frasco com 2,5g e 5g. Metotrexato 2,5mg comp. e 25mg/mL injetável Documentação para abertura	Para todos os medicamentos: - Relato médico descrevendo o diagnóstico síndrome identificando o fenótipo clínico do paciente. - Exames laboratoriais: - o creatinofosfoquinase (CPK) ou aldolase; e - o Hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP e desidrogenase láctica (DHL) (validade 90 dias); Para Ciclosporina, acrescentar: - creatinina (validade 90 dias). Para Hidroxiquina, acrescentar: - Exame oftalmológico (validade 1 ano). Para Metotrexato, acrescentar: - creatinina (validade 90 dias). - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Imunoglobulina, acrescentar: - Dosagem sérica de IgA (validade 90 dias)	Para todos: - Relato médico quanto a evolução da atividade da doença, através da descrição da força muscular em quadríceps, deltoides e flexores de pescoço ou por um dos instrumentos de avaliação da atividade de miopatias inflamatórias descritos no PCDT-MS. Periodicidade: semestral. - CPK ou aldolase. Periodicidade: semestral. Para Azatioprina, acrescentar: - hemograma completo, fosfatase alcalina, AST/TGO, ALT/TGP. Periodicidade: Trimestral. Para Metotrexato, acrescentar: - hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP e creatinina. Periodicidade: Trimestral. - Beta HCG (para mulheres em idade fértil). Periodicidade: Semestral	M33.0 (para todos) M33.1 (para todos) M33.2 (exceto para hidroxiquina) Reumatologista (Preferencialmente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

	Obs. A depender do contexto clínico, podem ser solicitados pela Farmácia Cidadã, outros exames/documentos complementares para confirmação do diagnóstico e ao estágio de gravidade da doença.	Para Ciclosporina, acrescentar: - Creatinina. Periodicidade: Trimestral - Relato médico em LME quanto ao monitoramento da pressão arterial sistêmica. Periodicidade: semestral. - Colesterol total e frações, triglicerídeos e potássio sérico. Periodicidade: semestral. Para Hidroxicloroquina: - Exame oftalmológico. Periodicidade: Anual.	
MUCOPOLISSARIDOSE TIPO I (Protocolo MS) Laronidase 0,58 mg/ml injetável – frasco 5MI Documentação para abertura	- Laudo médico sobre a condição clínica do paciente e a presença dos sintomas e sinais característicos para o diagnóstico clínico; (validade 3 meses) - Exames laboratoriais confirmatórios do diagnóstico: ○ Atividade da enzima alfa-L-iduronidase (IDUA) em plasma, fibroblastos ou leucócitos E atividade da enzima de referência na mesma amostra e pelo mesmo método E Dosagem urinária de Glicosaminoglicanos totais (GAGs) ou de sulfatos de heparan e dermatan (DS) (sem validade) OU ○ Atividade da enzima alfa-L-iduronidase (IDUA) em plasma, fibroblastos, leucócitos ou em papel-filtro E atividade da enzima de referência na mesma amostra e pelo mesmo método E exame genético com presença de mutações patogênicas em homozigose ou heterozigose composta no gene IDUA. (sem validade)	- Laudo médico informando a adesão ao número de infusões previstas no período e a evolução do quadro clínico do paciente com registro atualizadas do peso e altura, da pressão arterial, da hepatimetria e da mobilidade articular. Periodicidade: semestral. - Dosagem urinária de glicosaminoglicanos totais (GAGs). Periodicidade: semestral. - Exame neurológico. Periodicidade: semestral.	E76.0 PCDT
MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO II (Protocolo MS) Idursulfase alfa 2 mg/ml solução injetável frasco com 3 ml Documentação para abertura	- laudo médico sobre a condição clínica do paciente e a presença dos sintomas e sinais característicos para o diagnóstico clínico com registro atualizado do peso, altura, perímetro cefálico e quantificação do tamanho do fígado (hepatimetria) e do baço; (validade 3 meses) - Exame de comprovação diagnóstica: ○ Exame de mutação genética reconhecidamente patogênica do gene IDS; (sem validade) ou ○ Exame da atividade de iduronato-2-sulfatase (IDS) em plasma, leucócito ou fibroblasto e da atividade pelo menos outra sulfatase (medida na mesma	- Laudo médico informando a adesão ao tratamento e a evolução do quadro clínico do paciente com registro atualizadas do peso e altura, pressão arterial, quantificação do tamanho do fígado (hepatimetria) e do baço; Periodicidade: semestral - Dosagem de glicosaminoglicanos na urina. Periodicidade: anual. - Laudo da avaliação do neurodesenvolvimento emitido por médico	E76.1 PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



	amostra na qual determinada a atividade de IDS); e dosagem de glicosaminoglicanos (GAG) na urina; (sem validade) - Laudo de avaliação neurológica (validade 3 meses)	neurologista. Periodicidade: anual.	
<u>MUCOPOLISSARIDOSE TIPO IV A</u> (PCDT-MS) Alfaelossulfase 1 mg/ml injetável. Documentação para abertura	- Informação médica sobre a condição clínica do paciente e informação sobre a presença de sintomas e sinais característicos para o diagnóstico clínico; - Exames laboratoriais confirmatórios do diagnóstico: Atividade da GALNS em fibroblastos ou leucócitos E Atividade de pelo menos uma outra sulfatase (arilsulfatase A, arilsulfatase B, heparan N-sulfatase ou iduronato-sulfatase) avaliada na mesma amostra e pelo mesmo método; OU Atividade da GALNS em papel-filtro, fibroblastos ou leucócitos E Mutações patogênicas em homozigose ou heterozigose composta no gene GALNS. - Distância percorrida no Teste da caminhada de 6 minutos (TC6M) (validade 3 meses); - Espirometria (Prova de Função Pulmonar Completa com Broncodilatador) (validade 180 dias); - Ecocardiograma (validade 180 dias);	- Laudo médico informando a evolução do quadro clínico do paciente e a adesão ao número de infusões previstas no período; Periodicidade: semestral - Distância percorrida no Teste da caminhada de 6 minutos (TC6M); - Dosagem urinária de glicosaminoglicanos; - Ecocardiograma; - Espirometria; Periodicidade: semestral no primeiro ano, após, anual.	E76.2 Tratamento deve ser feito por equipe multidisciplinar em serviços especializados. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

<u>MUCOPOLISSARIDOSE TIPO VI</u> (PCDT-MS) Galsulfase 1mg/ml injetável Documentação para abertura	- Informação médica sobre a condição clínica do paciente e a presença dos sintomas e sinais característicos para o diagnóstico clínico; - Exames laboratoriais confirmatórios do diagnóstico: • Atividade da ASB em fibroblastos ou leucócitos E Atividade de pelo menos uma outra sulfatase (arilsulfatase A, arilsulfatase B, heparan N-sulfatase ou iduronato-sulfatase) avaliada na mesma amostra e pelo mesmo método E Dosagem urinária de Glicosaminaoglicanos totais (GAGs) ou de Dermatan sulfato (DS) • <u>OU</u> • Atividade da ASB em papel-filtro, fibroblastos ou leucócitos E Atividade de pelo menos uma outra sulfatase (arilsulfatase A, arilsulfatase B, heparan N-sulfatase ou iduronato-sulfatase) avaliada na mesma amostra e pelo mesmo método E Mutações patogênicas em homozigose ou heterozigose composta no gene <i>ASB</i>. - Para pacientes com idade igual ou superior a 7 anos, acrescentar: • Distância percorrida no Teste da caminhada de 12 minutos (TC12M) (validade 3 meses); • Espirometria (Prova de Função Pulmonar Completa com Broncodilatador) (validade 180 dias);	- Laudo médico informando a evolução do quadro clínico do paciente e a adesão ao número de infusões previstas no período; Periodicidade: semestral - Dosagem urinária de glicosaminoglicanos totais (GAGs); Periodicidade: semestral no primeiro ano, após, anual. - Para pacientes com idade igual ou superior a 7 anos, acrescentar: - Distância percorrida no Teste da caminhada de 12 minutos (TC12M); Periodicidade: semestral. - Espirometria (Prova de Função Pulmonar Completa com Broncodilatador); Periodicidade: semestral no primeiro ano, após, anual.	E76.2 Tratamento deve ser feito em serviços especializados com equipe multidisciplinar PCDT
---	---	---	--



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



MUCOPOLISSARIDOSE TIPO VII (PCDT-MS) Alfavestronidase 2mg/mL injetável – frasco 5mL Documentação para abertura	- Laudo médico sobre a condição clínica do paciente e a presença dos sintomas e sinais característicos para o diagnóstico clínico; (validade 3 meses) - Exames laboratoriais confirmatórios do diagnóstico: - o Dosagem urinária de Glicosaminaoglicanos totais (GAGs) ou de sulfatos de heparan (SH) e sulfatos de dermatan (SD); (sem validade) - o Atividade da beta-glicuronidase (GUSB) em fibroblastos ou leucócitos ou sangue impregnado em papel filtro; (sem validade) - o Variantes patogênicas em homozigose ou heterozigose composta no gene GUSB OU Atividade da enzima alfa-L-iduronidase (IDUA) e da iduronato-sulfatase (IDS) em fibroblastos ou leucócitos ou sangue impregnado na mesma amostra; (sem validade) - Laudo de avaliação neurológica; (validade 6 meses) - Laudo de avaliação oftalmológica (acuidade visual); (validade 6 meses) - Distância percorrida no Teste da caminhada de 6 minutos, para pacientes acima de 3 anos (TC6M); (validade 6 meses) - Espirometria (Prova de Função Pulmonar Completa com Broncodilatador), para pacientes com idade superior a 6 anos; (validade 6 meses) - Avaliação da mobilidade articular (incluindo flexão de ombro); (validade 6 meses)	- Laudo médico informando a adesão ao tratamento e a evolução do quadro clínico do paciente com registro atualizadas do peso e altura, pressão arterial, hepatimetria e medidas do tamanho do baço; Periodicidade: semestral - Laudo de avaliação da mobilidade articular (incluindo flexão de ombro). Periodicidade: semestral, se paciente apresentar condições de realizá-lo. - Laudo de avaliação oftalmológica (acuidade visual). Periodicidade: semestral, se paciente apresentar condições de realizá-lo. - Espirometria (pacientes acima de 6 anos). Periodicidade: semestral, se paciente apresentar condições de realizá-lo. - Teste de caminhada de 6 minutos (pacientes acima de 3 anos). Periodicidade: semestral. - Dosagem urinária de glicosaminoglicanos totais (GAGs); Periodicidade: anual.	E76.2 PCDT
OSTEOMIELITE CRÔNICA (ESTADUAL) Ertapenem 1g injetável F/A Teicoplanina 400mg injetável F/A Documentação para abertura *Atualizado em 14/10/2022	- Laudo de cultura com Antibiógrama ou Teste de Susceptibilidade antimicrobiana (TSA) demonstrando sensibilidade ao medicamento (ertapenem e/ou teicoplanina) solicitado (validade 90 dias). - Exames laboratoriais: Hemograma completo, velocidade de hemossedimentação (VHS), Proteína C-reativa (PCR), ureia, creatinina, AST/TGO e ALT/TGP. (validade 90 dias)	- Hemograma completo, VHS, PCR ureia, creatinina, AST/TGO, ALT/TGP. Periodicidade: trimestral.	M46.2 M86.4 M86.6 M86.9 Infectologista (Exclusivamente) Protocolo Estadual

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

Osteoporose (Protocolo MS) Ácido Zoledrônico 5mg/100mL F/A Calcitonina 200UI Spray Nasal Calcitriol 0,25mcg cáps. Pamidronato 60 mg injetável F/A Raloxifeno 60mg comp. Risedronato 35 mg comp Romosozumabe 90mg/mL seringa com 1,17mL (equivalente a Romosozumabe 105mg seringa) (somente mulheres) Documentação para abertura	Para Todos: - Formulário para solicitação de medicamentos para o tratamento de osteoporose preenchido pelo médico assistente (validade 90 dias) - Densitometria óssea (validade 1 ano) - Exames laboratoriais: cálcio sérico, 25- hidroxivitamina D e creatinina ou clearance de creatinina (validade 90 dias). - Caso apresente histórico de fratura osteoporótica: anexar laudo da radiografia que evidencia a fratura (sem validade); - Caso apresente intolerância ou dificuldades de deglutição aos bisfosfonatos orais: anexar laudo do gastroenterologista e/ou exame de Endoscopia Digestiva Alta referente à doença gastrointestinal (sem validade).	Para todos: - Densitometria óssea Periodicidade: a cada 2 anos. - Dosagem sérica de 25-hidroxivitamina D e cálcio e clearance de creatinina Periodicidade: semestral Romsozumabe: Período máximo de fornecimento de 1 ano.	M80.0 / M80.1 M81.0 / M81.1 (APENAS PARA MULHERES) M80.2 / M80.3 M80.4 / M80.5 M80.8 / M81.2 M81.3 / M81.4 M81.5 / M81.6 M81.8 M82.0 M82.1 / M82.8 M85.8 (AMBOS OS SEXOS) PCDT
PROFILAXIA DA REINFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO (Protocolo MS) Lamivudina 150mg comp. e 10mg/mL solução oral Imunoglobulina anti-Hepatite B 100UI e 600UI - frasco	Para paciente com previsão de transplante para os próximos 3 meses: • Doença hepática Crônica Terminal por vírus B: - HBsAg (+) - HBeAg - Se HBeAg(-): Teste de quantificação de DNA-HBV - OU • Hepatite fulminante por vírus B: - Anti-HBc IgM (+). Para paciente pós – transplantado: - Teste de quantificação do DNA do HBV pela reação em tempo real quantitativa da cadeia de polimerase [não obrigatório para pacientes crônicos HBeAg (-)], HBsAg, Anti-HBc IgM. <u>Critérios de exclusão:</u> - Portadores de cirrose por vírus B com duas quantificações consecutivas do DNA-HBV (com intervalo mínimo de três meses), em uso de lamivudina, com mais 100.000 cópias/ml; - Portadores de HIV; - Idade < 12 anos;	- Teste de quantificação do DNA – HBV pela reação em tempo real qualitativa da cadeia de polimerase. Periodicidade: 1º, 4º e 7º mês. - Anti – HBs, ALT e AST. Periodicidade: Mensal, no 1º ano de tratamento e, após, semestral, quando estabilizada a dose da Imunoglobulina da Hepatite B(3 doses consecutivas iguais. - HBsAg. Periodicidade: Semestral (não obrigatório).	B18.0 B18.1 B16.0 B16.2 Infectologista Gastroenterologista (Preferencialmente).

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

	- Contra-indicação ao uso de Lamivudina ou Imunoglobulina anti-hepatite B.		
PROFILAXIA DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA APÓS CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL OU JOELHO (Critério de Uso - Estadual) Etexilato de Dabigatrana 110mg e 150mg cáps.	- Laudo médico relatando tratar-se de pós-operatório imediato de cirurgia de artroplastia de quadril, ou joelho e informando que o paciente não possui nenhum critério de exclusão (validade 90 dias). - Idade maior que 18 anos. - Resultado de Clearance de Creatinina (CICr), ou pelo menos laudo médico com o valor do Clearance de Creatinina estimado*, OBRIGATORIAMENTE com resultado superior a 30ml/min. *O clearance de creatinina estimado deve ser calculado a partir de uma creatinina sérica que tenha validade de no máximo 90 dias. Assim, devem constar no processo: 1- exame de clearance de creatinina (validade 90 dias); OU 2- laudo médico com Clearance estimado acompanhado de exame de creatinina sérica (validade de 90 dias) e peso atualizado do paciente.	Não se aplica, pois o esquema posológico, para esta indicação é o seguinte: - Artroplastia total do joelho = 10 dias (20 cp. de 110 mg, ou 10 cp. de 150 mg, em pacientes com insuficiência renal moderada (CICr de 30-50 ml/min). - Artroplastia total do quadril = 35 dias (70 cp. de 110 mg, ou 35 cp. de 150 mg, em pacientes com insuficiência renal moderada (CICr de 30-50 ml/min).	M16: Coxartrose (artrose do quadril) – todos M17: Gonartrose [artrose do joelho] – todos M23.9 : Transtorno interno não especificado do joelho Ortopedista, Cirurgião Vascular, Intensivista (Preferencialmente) Protocolo Estadual
PSORÍASE (Protocolo MS) Acitretina 10mg e 25mg caps. Adalimumabe 40mg seringa (acima 6 anos) Calcipotriol 50mcg/g pomada Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps	Para todos os medicamentos: - Relato médico informando: - o grau de gravidade das lesões informado o valor do índice de extensão da psoríase – PASI ou do Índice de qualidade de vida em dermatologia (DLQI). - o(s) medicamento(s) utilizado(s), tempo de uso e a evolução clínica durante sua utilização (validade 3 meses); - Exames, exceto para calcipotriol: - Hemograma, Creatinina, AST/TGO e ALT/TGP (validade 3 meses);	Para todos os medicamentos - Índice PASI ou DLQI Periodicidade: semestral. - Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP, creatinina. Periodicidade: Trimestral nos primeiros 6 meses. Após, semestral. Para Acitretina: - Colesterol total e frações e triglicerídeos Periodicidade: Mensal, nos primeiros 3 meses de tratamento e, após, trimestral. - Beta HCG atual em mulheres em idade fértil	L40.0 L40.1 L40.4 L40.8 Dermatologista (Preferencialmente) Devem ser atendidos em serviços especializados. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

Ciclosporina 100mg/mL sol. oral (frasco de 50 ml) Clobetasol 0,5mg/g creme e sol capilar Etanercepte 25mg e 50mg seringa Metotrexato 2,5mg comp. e 25mg/ml injetável Risanquinumabe 150 mg/mL injetável (acima de 18 anos) Secuquinumabe 150 mg/mL injetável (acima de 18 anos) Ustequinumabe 45 mg/0,5 mL injetável Documentação para abertura	Para Acitretina, acrescentar: - Bilirrubina, Colesterol total e frações, triglicerídeos e glicose (validade 3 meses) - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil - Para Crianças: Raio X de mãos e punhos (validade 1 ano). Para Calcipotriol, acrescentar: - Cálcio Sérico (validade 3 meses). Para Metotrexate, acrescentar: - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Adalimumabe, Etanercepte, Risanquinumabe, Secuquinumabe e Ustequinumabe, acrescentar: - Exigido somente uma vez no início de qualquer um desses medicamentos, não necessário para substituição: - o PPD ou IGRA (validade 1 ano); - o Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano); - o HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano);	Periodicidade: Mensal - Para crianças: Raios-X de mãos e punhos. Periodicidade: Anual.	
PUBERDADE PRECOCE CENTRAL (Protocolo MS) Ciproterona 50mg comp. Gosserrelina 3,6 mg e 10,8mg seringa preenchida Leuprorrelina 3,75 mg e 45mg injetável Triptorrelina 3,75 mg, 11,25 mg e 22,5 mg injetável Documentação para abertura *Atualizado em 26/12/2022	- Relato médico informando idade de início do desenvolvimento puberal, características e estadiamento puberal de Tanner atuais, volume testicular nos meninos, altura dos pais biológicos e tempo de evolução entre os estágios (validade 3 meses) - Curva de crescimento com ao menos duas medidas de peso e estatura com intervalo mínimo de 06 meses entre elas (validade 3 meses) - Laudo da radiografia de mãos e punhos com determinação da idade óssea (validade 3 meses); - Ressonância Magnética de Sela Turca para meninos de todas as idades e para meninas até 06 anos. (validade 2 anos); - Ultrassonografia pélvica para meninas (validade 2 anos); - Dosagem de LH (validade 3 meses);	Para todos: - Curva de crescimento com peso, altura e estadiamento puberal de Tanner. Periodicidade: Trimestral. - Dosagem de LH após aplicação de leuprorrelina ou gosserrelina. Periodicidade: no 3º e no 6º mês de tratamento e em caso de mudança de dose - Laudo da radiografia das mãos e punhos com determinação da idade óssea. Periodicidade: Anual. Para Ciproterona, acrescentar: - ALT/TGP, AST/TGO e bilirrubinas. Periodicidade: semestral	E22.8 Endocrinologista (Exclusivamente) Devem ser atendidos em serviços especializados para seu adequado diagnóstico. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



	- Teste de estímulo ao LH e FSH após GnRH ou seu agonista, (exceto para meninas menores de 3 anos) (validade: 2 anos). Para Ciproterona, acrescentar: - ALT/TGP, AST/TGO e bilirrubina (validade 3 meses). Observação 2: para o teste de provocação: documentos necessários estão em termo específico. Formulário Teste Leuprorrelina Critérios para realização do teste hormonal provocativo com Leuprorrelina		
RAQUITISMO E OSTEOMALÁCEA (Protocolo MS) Burosumabe 10mg/mL, 20mg/mL e 30mg/mL Injetável (início de tratamento com idade entre 1 a 17 anos) Calcitriol 0,25mcg cáps Fósforo elementar 15mg/mL (solução oral fosfatada) (Formulação manipulada - composição conforme Quadro 3 do PCDT) Fósforo elementar 250mg cáps (Formulação manipulada - composição conforme Quadro 4 do PCDT) Documentação para abertura	Para todos: - Dosagens séricas de 25-Hidroxivitamina D, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, PTH, ALT/TGP, AST/TGO, creatinina, uréia, potássio (validade 90 dias) - Dosagem urinária de cálcio, de fósforo, clearance de creatinina, medida de pH e densidade urinária (validade 90 dias) - Gasometria venosa (validade 90 dias) - Radiografia de Antebraço e Joelho (validade 1 ano) Para Burosumabe, acrescentar: - Diagnóstico genético de HLX (sem validade) Exames não obrigatórios: - Análise histológica do osso, com marcação por tetraciclina (sem validade)	Para todos: - Radiografia das áreas afetadas. Periodicidade: No 1º e o 3º mês de início de tratamento. Após, trimestral. Para burosumabe: - Dosagens séricas de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, 25-Hidroxivitamina D. Periodicidade: No 1º, 3º e 6º mês de início de tratamento. Após, semestral. - Dosagem urinária de cálcio, fósforo e creatinina. Periodicidade: No 1º, 3º e 6º mês de início de tratamento. Após, semestral. - Ultrassonografia de rins e vias urinárias. Periodicidade: semestral no primeiro ano. Após, anual. Para Calcitriol, acrescentar: - Dosagens séricas de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina. Periodicidade: mensal nos primeiros três meses. Depois, Trimestral até manutenção do tratamento. Após, semestral. - Dosagem urinária de cálcio. Periodicidade: mensal nos primeiros três meses. Depois, trimestral até manutenção do tratamento. Após, semestral. - Ultrassonografia de rins e vias urinárias. Periodicidade: 1º ano. Após, anual ou bianual conforme orientação médica.	E55.0 E55.9 E64.3 E83.3 M83.0 M83.1 M83.2 M83.3 M83.8 Endocrinologista (Preferencialmente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



		Para solução oral fosfatada ou cápsula de fósforo elementar, acrescentar: - Dosagens séricas de cálcio, fósforo, creatinina e fosfatase alcalina. Periodicidade: Trimestral. - Dosagem urinária de cálcio. Periodicidade: Trimestral - Dosagens séricas de PTH e Ultrassonografia de rins e vias urinárias. Periodicidade: anual.	
RETOCOLITE ULCERATIVA (Protocolo MS) Azatioprina 50 mg comp. Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Mesalazina 400 mg, 500 mg e 800 mg comp. Mesalazina 250mg, 500mg e 1000mg supositório Mesalazina 2g sachê Mesalazina enema 1g + diluente 100ml	Para todos: - Relato médico informando detalhadamente a clínica do paciente, tratamentos prévios realizados e recaída doença/ano (validade 3 meses); - Laudo dos exames: - Endoscópio (colonoscopia ou retossigmoidoscopia) (validade 1 ano); e - Histopatológico (sem validade) *. *em caso de diagnóstico recente ou doença ativa poderá ser solicitado exame recente. Para Azatioprina, acrescentar: - Hemograma Completo, AST/TGO, ALT/TGP (validade 3 meses). Para Ciclosporina, acrescentar: - Ureia, Creatinina sérica, Ácido Úrico, Potássio, Lipídios e Magnésio (validade 3 meses). Para Sulfasalazina e Mesalazina, acrescentar: - Hemograma, EQU (EAS) e creatinina (validade 3 meses).	Para Azatioprina: - Hemograma completo, AST/TGP e ALT/TGO. Periodicidade: Trimestral. Se remissão sustentada e sem eventos adversos, semestral. Para Ciclosporina: - Ureia, Creatinina sérica, Ácido Úrico, Potássio, Lipídios e Magnésio. Periodicidade: Trimestral. Se remissão sustentada e sem eventos adversos, semestral. Para Sulfasalazina e Mesalazina: - Hemograma, EQU (EAS) e creatinina. Periodicidade: Semestral. Para Infliximabe, Tofacitinibe e Vedolizumabe: - Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP. Periodicidade: Trimestral.	K51.0 K51.2 K51.3 K51.5 K51.8 Gastroenterologista Proctologista (Exclusivamente) PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



Sulfassalazina 500 mg comp. Infliximabe 100mg F/A (acima 6 anos) Tofacitinibe 5mg comp. (acima 18 anos) Vedolizumabe 300mg F/A (acima 18 anos) Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	Para Infliximabe, Tofacitinibe e Vedolizumabe, acrescentar: - Exigido somente uma vez no início de qualquer um desses medicamentos, não necessário para substituição: - o PPD ou IGRA (validade 1 ano); - o Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano); - o HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano); - o Hemograma completo, AST/TGO, ALT/TGP, creatinina (validade 3 meses); - o Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. - Para substituição/troca entre eles: - o Laudo de exame endoscópico (colonoscopia ou retossigmoidoscopia) (validade 1 ano).	Para otimização de dose de Infliximabe, Tofacitinibe e Vedolizumabe: - Demonstração de doença ativa, determinada por sintomas clínicos em laudo médico ou por marcadores biológicos de inflamação ou por achados endoscópicos (colonoscopia). Periodicidade: Anual.	
SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS (Protocolo MS) Clopidogrel 75mg comp.	- Apresentação de prescrição médica, e laudo para solicitação de medicamentos excepcionais (LME); - Encaminhar Relatório de Alta Médica Hospitalar no caso de Síndrome Coronariana Aguda para comprovação de diagnóstico de Síndrome Coronariana Aguda e/ou laudo de Angioplastia Coronariana; - No caso de alergia ao AAS, encaminhar laudo de alergista; - No caso de intolerância gástrica ao AAS, encaminhar laudo de gastroenterologista ou laudo de endoscopia digestiva alta. * Validade 90 dias	-	I20.0 – I20.1 – I21.0 – I21.1 - I21.2 – I21.3 – I21.4 – I21.9 – I22.0 – I22.1 – I22.8 – I22.9 – I23.0 – I23.1 – I23.2 - I23.3 – I23.4 – I23.5 – I23.6 – I23.8– I24.0 I24.8 – I24.9 Cardiologista (Preferencialmente) Síndromes Coronarianas Agudas
SÍNDROME DE FALÊNCIA MEDULAR (Protocolo MS) Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Ciclofosfamida 50 mg drágea Eltrombopague 25 mg e 50 mg comprimidos Filgrastim 300mcg injetável F/A	Para Ciclosporina, Ciclofosfamida, Eltrombopague e Imunoglobulina: - Biópsia e/ou aspirado de medula óssea (sem validade) - Hemograma completo (validade 90 dias) - Contagem de reticulócitos (validade 90 dias) - Dosagem de ácido fólico e de vitamina B12 (validade 90 dias) - Dosagens séricas de HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano) - Somente para imunoglobulina, acrescentar: Laudo médico relatando se está em tratamento de imunossupressão (validade 90 dias) e Sorologia para parvovírus B19 (validade 180 dias) Para Filgrastim:	Para Ciclosporina: - Hemograma completo e contagem de reticulócitos - Dosagem sérica de ciclosporina, creatinina, ureia, sódio, potássio e magnésio. Periodicidade: semestral ou a cada alteração de dose. Para Ciclofosfamida: - Hemograma completo e contagem de reticulócitos. - Dosagem de creatinina e ureia. Periodicidade: na alteração de dose, sendo tempo máximo de fornecimento de 6 meses.	D60.0 (exceto Eltrombopague e Filgrastim) D60.1 (exceto Eltrombopague e Filgrastim) D60.8 (exceto Eltrombopague e Filgrastim) D61.0 (exceto Ciclofosfamida) D61.1 (exceto Ciclofosfamida) D61.2 (exceto Ciclofosfamida) D61.3 (exceto Ciclofosfamida) D61.8 (exceto Ciclofosfamida)

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



Imunoglobulina Humana 2,5g e 5,0g injetável F/A Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	- Biópsia e/ou aspirado de medula óssea (sem validade) - 1 Hemograma com contagem de neutrófilos abaixo de 200/mm³ ou 6 hemogramas realizados 2 vezes por semana durante 3 semanas (validade 90 dias) - Dosagem de ácido fólico e de vitamina B12 (validade 90 dias) - Dosagens séricas de HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV	Para Eltrombopague: - Hemograma completo e contagem de reticulócitos. - Dosagem de AST/TGO, ALT/TGP, Gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas Periodicidade: semestral ou a cada alteração de dose. Para Filgrastim - Neutropenias: - Hemograma completo. Periodicidade: mensal até contagem de neutrófilos estabilizada. Após, trimestral. Obs.: O PCDT-MS preconiza que o tratamento com imunoglobulina não deve ultrapassar 5 dias.	D69.3 (exceto Filgrastim e Ciclosporina) D70 (apenas Filgrastim) Z94.8 (apenas Filgrastim) Hematologista (Exclusivamente) Devem ser atendidos em serviços especializados em hematologia. PCDT
SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRE (Protocolo MS) Imunoglobulina Humana 2,5 g, 5 g F/A Documentação para abertura	- Laudo Médico detalhado, onde fique evidenciado que se trata de síndrome de Guillain-Barre, com manifestação de déficit motor, e/ou evolução para disfunção respiratória, condição caracterizada como emergência neurológica, onde o uso da imunoglobulina é fundamental (Validade 90 dias); - Liquor (com resultado de celularidade e proteína); - Receita em duas vias; - LME; - A dosagem de IgA e exame complementar (estudo neurofisiológico ou anticorpos anti-receptor da acetilcolina), podem ser entregue posteriormente uma vez que seus resultados não são imediatos e trata-se de uma emergência médica.	*** Por ser uma emergência neurológica, pacientes hospitalizados podem ser atendidos. Não será necessário apresentar a ALTA HOSPITALAR para retirada do medicamento.	G61.0 Neurologista (Preferencialmente) PCDT
SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS (SPI) (Critérios de uso – Estadual) Pramipexol 0,25mg Documentação para abertura	- Laudo médico relatando ser o paciente portador de SPI; - Tomografia computadorizada ou ressonância magnética do crânio; - Dosagem de ferritina sérica; - Uréia e creatinina; - Paciente maior que 18 anos. * Validade 90 dias	- Laudo médico relatando resposta clínica do paciente ao tratamento. Periodicidade: Trimestral. - Uréia e Creatinina. Periodicidade: Trimestral no primeiro ano. Após, semestralmente.	G25.8 Neurologista (Obrigatoriamente) Protocolo Estadual

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



SÍNDROME DE TURNER (Protocolo MS) Somatropina 4 UI e 12 UI F/A Documentação para abertura	Para todas as idades: - Determinação de Cariótipo em sangue periférico (sem validade); -TSH e T4 livre (validade: 3 meses). Se idade entre 02 e 05 anos: - Curva de crescimento da Organização Mundial de Saúde (OMS)* (validade: 03 meses); Se idade acima de 05 anos: - Curva de crescimento do <i>National Center for Health Statistics</i> (NCHS)* (validade: 3 meses); - Radiografia de mãos e punhos (validade: 03 meses). *Obs: se possível, anotar ao menos 02 medidas de peso e estatura com intervalo mínimo de 06 meses entre elas.	- Medidas de estatura e peso corporal acompanhadas pelas curvas de crescimento. Periodicidade: Semestral. - TSH e T4 livre. Periodicidade: Anual. - Radiografia de mãos e punhos com determinação de idade óssea. Periodicidade: Anual. - IGF-1 (fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 ou somatomedina C). Periodicidade: Anual ou quando houver ajuste de dose. Após 10 anos de idade, acrescentar: - AST/TGO, AL/TGP, Gama-GT, Glicose jejum e hemoglobina glicada. Periodicidade: anual - Dosagem de vitamina D. Periodicidade: a cada 02 anos.	Q96.0 Q96.1 Q96.2 Q96.3 Q96.4 Q96.8 Endocrinologista Geneticista Endocrinopediatra (Preferencialmente) PCDT
SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTICOS E HIRSUTISMO (Protocolo MS) Ciproterona 50 mg comp. Documentação para abertura	* Validade 90 dias: - Ultrassonografia pélvica; - Diagnóstico de SOP com irregularidade menstrual e evidência clínica de hiperandrogenismo (hirsutismo, acne, alopecia androgênica) <u>ou</u> evidência laboratorial de hiperandrogenismo (nível sérico de testosterona); - Diagnóstico de hirsutismo idiopático com ciclos regulares e ovulatórios, hirsutismo isolado e ausência de ovários policísticos à ultrassonografia pélvica; - Medida sérica de 17-hidroxiprogesterona; - Prolactina sérica; - Glicemia de jejum e após sobrecarga de 75g de glicose (para mulheres obesas ou com história familiar de diabetes melito); - Sulfato de deidroepiandrotestosterona; - TSH;	- TGO, TGP e bilirrubinas. Periodicidade: Semestral. - Dosagem sérica de testosterona. Periodicidade: Após 3 meses do tratamento (para determinar a eficácia clínica e os níveis de androgênios).	E28.0 E28.2 L68.0 Ginecologia Endocrinologia (Exclusivamente) Devem ser encaminhadas para um serviço especializado em Ginecologia ou Endocrinologia. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



	- Colesterol total, HDL e triglicerídeos (para pacientes com suspeita de síndrome metabólica); - TGO, TGP e bilirrubinas; - Beta HCG atual em mulheres em idade fértil (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade).		
SÍNDROME MIELODISPLÁSICA DE BAIXO RISCO (Protocolo MS) Alfaeopetina 10.000UI F/A Filgrastim 300mcg injetável F/A Talidomida 100 mg comp Documentação para abertura *Atualizado em 08/12/2022	- Relato médio informando a categoria de risco do paciente de acordo com os seguintes escores: * Sistema Internacional de Escore Prognóstico (IPSS), categorizado em: Baixo, Intermediário 1, Intermediário 2 ou Alto risco; ou * Sistema Internacional de Escore Prognóstico Revisado (IPSS-R), categorizada em: Muito baixo, Baixo, Intermediário Alto e muito alto. Neste caso, deve-se informar a pontuação obtida do paciente. - Hemograma completo (validade 3 meses). Para Filgrastim, acrescentar: - Relato médico informando resposta ao tratamento com Alfaepotina e seu tempo de uso. Para Talidomida, acrescentar: - Relato médico informando resposta ao tratamento com Alfaepotina e seu tempo de uso. - Dosagem de Beta-HCG ou urinário de alta sensibilidade, para mulheres na idade fértil (pacientes que se encontram entre a menarca e a menopausa) (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade). - Documentos exigidos conforme RDC nº 11/2011 da ANVISA:	Para Alfaeopetina: - Hemograma completo Periodicidade: mensal, pelo menos até o primeiro semestre. Após, se resposta completa, trimestral. Para Filgrastim: - Hemograma completo Periodicidade: mensal até a definição da dose ideal de acordo com a necessidade e resposta. Após, trimestral. Para Talidomida: - Hemograma completo, fosfatase alcalina e AST/TGO e ALT/TGP Periodicidade: trimestral. - Beta HCG atual em mulheres em idade fértil Periodicidade: Mensal	D46.0 D46.1 D46.4 D46.7 Hematologista (Exclusivamente) PCDT



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



	* Notificação de receita de talidomida; * Termo de Responsabilidade/Esclarecimento específico para o usuário da Talidomida		
SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA EM ADULTOS (Protocolo MS) Ciclofosfamida 50 mg drágea Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	- biópsia renal (diagnóstico histopatológico de biópsia renal); - proteinúria 24 h ou índice proteína/creatinina(IPC) em amostra de urina; - EAS; - albumina sérica; - colesterol total, HDL e triglicerídeos; - creatinina sérica ou clearance de creatinina; - hemograma completo e contagem de plaquetas; - glicose; - TGO, TGP; - laudo médico (LME) informando se foi descartado causas secundárias como diabetes melito, hepatites virais, soropositividade para HIV, sífilis, collagenoses, infecções virais ou bacterianas, uso de medicamentos, neoplasias, etc. * Validade 3 meses - Beta HCG atual em mulheres em idade fértil (validade 1 mês) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) (para ciclofosfamida);	- Creatinina sérica, proteinúria 24 horas ou índice proteína/creatinina em amostra de urina, albumina sérica, colesterol total, HDL, triglicerídeos, EAS, hemograma completo e glicose. Periodicidade: A cada 3 meses. Para Ciclofosfamida: - Hemograma completo, TGO, TGP. Periodicidade: Mensal. Para Ciclosporina: - Dosagem sérica de ciclosporina e creatinina. Periodicidade: Mensal.	N04.0/ N04.1/ N04.2 N04.3/ N04.4/ N04.5 N04.6/ N04.7/ N04.8 N04.9 Nefrologista (Exclusivamente) Devem ser atendidos, especialmente na fase aguda, em serviços especializados. PCDT
SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - (Protocolo MS) Ciclofosfamida 50mg drágea Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Tacrolimo 1 e 5mg cáps. Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	Para todos: - Relato médico informando se o paciente é sensível ou resistente à corticosteroides, o tratamento prévio utilizado e a ocorrência de recidivas e/ou de eventos adversos Cópia dos exames (validade 3 meses): - Proteinúria ou Índice de proteinúria/creatininúria - Albumina sérica - Hemograma, Creatinina, Colesterol total e triglicerídeos - EQU(EAS) - Sorológicos para rastreio de doenças infecciosas: HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, fator antinuclear (FAN) e IgG e IgM anti-toxoplasmose Exigido uma única vez para abertura de processo, não necessário para substituição/troca de medicamentos, acrescentar: - Biópsia renal em crianças menores de 1 ano de idade ou idade	Pra todos: - Albumina sérica; - Colesterol total e triglicerídeos; - Hemograma; - Glicose; - EQU(EAS); - Creatinina sérica; - Índice proteinúria/creatininúria. Periodicidade: Trimestral. Para ciclosporina, acrescentar: - Dosagem sérica de ciclosporina Periodicidade: trimestral no primeiro semestre, após semestral. A solicitação de outros exames deve ser individualizada.	N04.0/ N04.1/ N04.2 N04.3/ N04.4/ N04.5 N04.6/ N04.7/ N04.8 Nefrologista (Preferencialmente) É recomendável que os pacientes sejam acompanhados, especialmente na fase aguda, em serviços especializados em nefrologia. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

	acima de 8 anos ou pacientes com resistência a corticosteroides ou hematúria macroscópica ou hipertensão sustentada ou complemento sérico diminuído (sem validade); Para tacrolimo, acrescentar: - Relato médico informando a ocorrência de hipertricose ou hiperplasia gengival associado ao uso da ciclosporina (validade 90 dias)		
SOBRECARGA DE FERRO (Protocolo MS) Desferroxamina 500 mg F/A Deferiprona 500 mg comp Deferiprona 1000mg comp de lib prolongada. (recém incorporado, ainda não disponível) Deferasirox 125 mg, 250 mg e 500 mg comp. Documentação para abertura	Para todos os medicamentos: - Relato médico detalhando o diagnóstico (validade 3 meses); - ferritina sérica (validade 3 meses) ou biópsia hepática (validade 12 meses) ou ressonância magnética por T2* cardíaca ou hepática (validade 12 meses); - saturação de transferrina, creatinina, AST/TGO, AL/TGP, Gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas (validade 3 meses). Para Deferiprona, acrescentar: - Hemograma (validade 3 meses). - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. Para Desferroxamina, acrescentar: - Acuidade visual e auditiva (validade: 6 meses).	Para Todos: - Ferritina sérica, saturação de transferrina, creatinina, AST/TGO, AL/TGP, Gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas. Periodicidade: Trimestral. Para Deferiprona, acrescentar: - Hemograma. Periodicidade: Mensal, nos primeiros 3 meses. Após, trimestral. Para Desferroxamina, acrescentar: - Acuidade visual e auditiva. Periodicidade: Anual.	T45.4 E83.1 Hematologista (Preferencialmente) PCDT
TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR DO TIPO I (Protocolo MS) Clozapina 25mg e 100mg comp. Lamotrigina 25mg, 50mg e 100mg comp. Olanzapina 5mg e 10 mg comp. Quetiapina 25mg, 100mg, 200mg e 300mg comp. Risperidona 1mg e 2mg comp. Documentação para abertura	- Dados antropométricos: peso, altura e IMC e três medidas de pressão arterial em datas diferentes. - Relato médico detalhado informando a ocorrência ou não de história familiar ou prévia de síndrome neuroléptica maligna (no caso de antipsicóticos), suicídio, obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito e outras comorbidades – (validade 90 dias). Para Clozapina, Olanzapina, Quetiapina e Risperidona: - Hemograma completo, colesterol total e frações, triglicerídios, glicemia de jejum (validade 3 meses). - Para Lamotrigina: - Hemograma completo, TGO e TGP (validade 3 meses).	Para todos os medicamentos: - Registro do valor da pressão arterial e dados antropométricos: peso, altura e IMC Periodicidade: 3,6 e 12 meses, após anual. Para Lamotrigina: - Hemograma, TGO e TGP Periodicidade: Anual Para Risperidona, Quetiapina e Olanzapina: - Glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídios. Periodicidade: Trimestral no primeiro ano, após anual. Para Clozapina: - hemograma Periodicidade: mensal - Glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicerídios e prolactina	F31.1 F31.2 F31.3 F31.4 F31.5 F31.6 F31.7 Psiquiatra Médico do Programas de Saúde Mental do SUS (Exclusivamente) Devem ser compartilhados entre as equipes de Atenção Básica, os núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), os serviços estratégicos em saúde mental (Centros de Atenção Psicossocial)

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



		Periodicidade: Trimestral no primeiro ano, após anual. - Prolactina. Periodicidade: Anual	- CAPS) e outros serviços da RAPS (serviços hospitalares de referência com leitos de saúde mental). PCDT
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (Protocolo Estadual) Metilfenidato 10mg comp lib imediata* Metilfenidato cáps lib prolongada de 10 mg, 20 mg, 30 mg e 40 mg* Metilfenidato comp lib prolongada 18mg, 36mg e 54mg* Verificar apresentações disponíveis conforme Nota Técnica Documentação para abertura	Para todos: - Relato médico informando o tratamento não farmacológico prescrito ao paciente (validade 3 meses); - Dosagem de TSH e T4 livre recente (validade 6 meses); - Formulário para solicitação de metilfenidato no tratamento do déficit de atenção com hiperatividade preenchido (validade 3 meses). Para Metilfenidato de liberação prolongada: - Laudo médico com descrição detalhada dos problemas de adesão ao tratamento com metilfenidato 10 mg de liberação imediata com comprometimento de eficácia, informando tempo de uso e posologia adotada (validade 3 meses).	Para todos: - laudo médico com descrição detalhada da evolução clínica do paciente, incluindo a resposta terapêutica e ocorrência de eventos adversos. Periodicidade: semestral - Cópia dos exame de hemograma com contagem total plaquetas, dosagem de TSH e T4 livre. Periodicidade: anual	F90.0 F90.1 F90.8 F90.9 Para crianças e adolescentes (6 a 19 anos): Pediatra Psiquiatra Neurologista (Exclusivamente) Para adultos (Acima de 19 anos): Psiquiatra (Exclusivamente) Protocolo Estadual
TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO (Protocolo MS) Clozapina 25 e 100mg comp. Olanzapina 5 e 10mg comp. Quetiapina 25mg, 100mg, 200mg e 300 mg comp. Risperidona 1mg e 2mg comp. Ziprasidona 40mg e 80mg comp. Documentação para abertura	Para todos: - Dosagens de Colesterol Total e Frações, Triglicerídeos, Glicemia de jejum (validade 3 meses). Para Clozapina, acrescentar: - Hemograma Completo (validade 3 meses).	Para todos: - Dosagens de Colesterol Total e Frações, Triglicerídeos, Glicemia de jejum. Periodicidade: Anual. Para Clozapina, acrescentar: - Hemograma Completo. Periodicidade: Mensal.	F25.0 F25.1 F25.2 Psiquiatra (Exclusivamente) Deve seguir critérios, normas e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a Rede de Atenção à Saúde Mental. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



TROMBOCITOPENIA IMUNE PRIMÁRIA (Protocolo MS) Azatioprina 50 mg comp. Ciclofosfamida 50 mg comp. Danazol 100mg e 200mg cáps. (Indisponível - Nota Técnica nº 021/2024) Eltrombopague 25mg e 50mg comp. Imunoglobulina humana: frasco com 2,5g, 5g. Rituximabe 500mg F/A (indisponível: item ainda não ofertado pelo MS para esta indicação) Romiplostim 250mcg/0,5mL pó para solução inj. Documentação para abertura	Para todos os medicamentos: - Relato médico detalhando o diagnóstico de PTI primária, o tempo de diagnóstico e os tratamentos prévios realizados (validade 3 meses); - Hemograma completo (validade 1 mês). - <u>Para pacientes acima de 18 anos:</u> Exigido somente uma vez no início de qualquer um dos medicamentos, não necessário para substituição: ○ HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano). Para Azatioprina e Eltrombopague, acrescentar: - ALT/TGP, AST/TGO, bilirrubinas e GGT (validade 3 meses). Para Danazol, acrescentar: - Beta HCG em mulheres em idade fértil (validade 1 mês) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade). Para Rituximabe, acrescentar: - Dosagem sérica das imunoglobulinas (validade: 3 meses). - PPD ou IGRA (validade 1 ano); - Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano); - Beta HCG em mulheres em idade fértil (validade 1 mês) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade).	Para todos os medicamentos: - Relato médico detalhando a evolução clínica. - Hemograma completo. Periodicidade: semestral ou a cada ajuste de dose. Para Azatioprina e Eltrombopague: - ALT/TGP, AST/TGO, bilirrubinas e GGT. Periodicidade: semestral Para Danazol: - Fosfatase alcalina, Colesterol total, DHL e triglicerídeos. Periodicidade: trimestral nos primeiros 6 meses e, após, semestral.	D69.3 Hematologista (Exclusivamente) PCDT
TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM GESTANTES COM TROMBOFILIA (Protocolo-MS) Enoxaparina 40mg/0,4mL e 60mg/0,6mL injetável Documentação para abertura * Atualizado em 13/09/22	• Dosagem de B-hCG sérico ou ultrassonografia transvaginal ou pélvica (atual); • Data provável do parto em laudo médico ou em exame de imagem; • Hemograma completo; • Creatinina sérica ou clearance de creatinina. Documentos necessários conforme a indicação clínica (pode ser mais que uma indicação): - História pessoal de tromboembolismo venoso (TEV): • Exame de imagem (ultrassonografia doppler colorido de vasos ou tomografia computadorizada ou ressonância magnética); • Informação médica se TEV é de baixa ou alto risco de recorrência ao paciente conforme PCDT; - Síndrome Antifosfolípideo (SAF):	- Hemograma completo e Creatinina sérica ou clearance de creatinina. Periodicidade: trimestral	D68.8/ I82.0/ I82.1 I82.2/ I82.3/ I82.8 O22.3/ O22.5 Ginecologista Hematologista Obstetra (Exclusivamente) Devem ser encaminhadas para atenção especializada. PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

	• Informações clínicas: Um ou mais episódios de trombose venosa arterial (anexar exame de imagem ou evidência histológica sem sinal de vasculite); ou histórico de pelo menos três abortamentos precoces (com menos de 10 semanas) sem causa aparente; ou histórico de óbito fetal com mais de dez semanas com produto morfológicamente normal e sem causa aparente; ou histórico de parto prematuro antes de 34 semanas com pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia ou insuficiência placentária; e • Exames laboratoriais: Duas dosagem com intervalo mínimo de 12 semanas de anticoagulante lúpico ou anticardiolipinalG e IgM ou Antibeta-2-glicoproteína I IgG e IgM. - Trombofilia hereditária de alto risco: • Exames laboratoriais: Dosagem de mutação homozigótica para o fator V de Leiden; ou mutação homozigótica para o gene da protrombina; ou deficiência da antitrombina III; ou Mutações heterozigóticas para o fator V de Leiden e do gene da protrombina associadas. - Trombofilia hereditária de baixo risco: • Exames laboratoriais: Dosagem laboratorial de mutação heterozigótica para o fator V de Leiden; ou mutação heterozigótica para o gene da protrombina; ou Deficiência da proteína C ou da proteína S; ou presença de anticorpo antifosfolípideo na ausência de eventos clínicos.		
--	--	--	--



SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA ANTICOAGULAÇÃO ORAL DURANTE A GRAVIDEZ (Critério Estadual) Enoxaparina 20 mg/0,2ml; 40 mg/0,4ml; 60 mg/0,6ml; 80 mg/0,8ml; 100 mg/ml injetável Enoxaparina *Atualizado em 06/11/2023	- Dosagem de B-hCG sérico ou ultrassonografia transvaginal ou pélvica (atual); - Data provável do parto em laudo médico ou em exame de imagem; - Hemograma completo; - Creatinina sérica ou clearance de creatinina. - Relato médico especificando a condição clínica da paciente para a anticoagulação: Documentos necessários conforme a indicação clínica: - Para mulheres com de TVP ou TEP durante a gravidez: - o Exame de imagem (US doppler dos membros inferiores ou Angiografia/venografia dos membros inferiores ou Tomografia/angio-tomografia de tórax ou Angiografia de vasos pulmonares ou Cintilografia pulmonar) (validade 6 meses). - Para mulheres com prótese mecânica valvular cardíaca: - o Exame comprobatório da válvula mecânica (Ecocardiograma ou Laudo do procedimento cardíaco) (sem validade) - Para condições mórbidas cardíacas como fibrilação atrial crônica e disfunção ventricular grave: Exame comprobatório da condição mórbida (Eletrocardiograma ou Holter ou ecocardiograma) (sem validade)	- Hemograma completo e Creatinina sérica ou clearance de creatinina. Periodicidade: trimestral - Período de fornecimento: Durante a gravidez e até seis semanas pós-parto	Não há restrição por CID-10 Ginecologista Hematologista Obstetra (Exclusivamente) Protocolo Estadual
PACIENTES COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP) OU TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) Enoxaparina 20 mg/0,2ml; 40 mg/0,4ml; 60 mg/0,6ml; 80 mg/0,8ml; 100 mg/ml injetável Critérios Estaduais *Atualizado em 06/11/2023	- Relato médico informando a condição clínica do paciente (validade 3 meses); - Exame de imagem evidenciando o TVP/TEP (US doppler dos membros inferiores ou Angiografia/venografia dos membros inferiores ou Tomografia/angio-tomografia de tórax ou Angiografia de vasos pulmonares ou Cintilografia pulmonar) (validade 6 meses).	- Período de fornecimento: máximo de 10 dias.	Não há restrição por CID-10 Protocolo Estadual



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL



SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA À ANTICOAGULAÇÃO ORAL Enoxaparina 20 mg/0,2ml; 40 mg/0,4ml; 60 mg/0,6ml; 80 mg/0,8ml; 100 mg/ml injetável Critérios Estaduais *Atualizado em 06/11/2023	- Relato médico informando que paciente está anticoagulado e o procedimento cirúrgico e a data o qual será realizado. (Validade 3 meses);	- Período de fornecimento: máximo de 14 dias, podendo ser iniciado em até 7 antes da data da cirurgia	Não há restrição por CID-10 Protocolo Estadual
PROFILAXIA DE TVP EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS DE JOELHO, QUADRIL, FEMUR OU ABDOMINAL Enoxaparina 40mg/0,4m e 60mg/0,6mL	- <u>Para paciente em programação cirúrgica:</u> relato médico informando qual procedimento cirúrgico e a data que será realizado (validade 03 meses); - <u>Para paciente já submetido à cirurgia:</u> relato médico informando o procedimento cirúrgico e documentação comprobatória da realização da cirurgia, como por exemplo relatório de alta hospitalar (validade 03 meses);	- Período de fornecimento: ○ Cirurgia abdominal = máximo de 21 dias ○ Cirurgia de Quadril ou Femur = máximo de 5 semanas. ○ Cirurgia de Joelho = máximo de 3 semanas.	Não há restrição por CID-10 Protocolo Estadual

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

UVEÍTES NÃO INFECCIOSAS (Protocolo MS) Adalimumabe 40mg injetável – seringa (Acima de 18 anos) Azatioprina 50 mg comp. Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Documentação para abertura *Atualizado em 29/12/2025	Para Todos: - Laudo oftalmológico informando a gravidade da doença, o comprometimento funcional ao paciente e os tratamentos prévios já realizados (validade 3 meses); e - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP (validade 3 meses). Para Ciclosporina, acrescentar: - Creatinina e ureia (validade 3 meses). Para Adalimumabe, acrescentar: - Creatinina e ureia (validade 3 meses); - PPD ou IGRA (validade 1 ano); - HBsAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano); - Laudo de Raios-X de tórax (validade 1 ano); - Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil.	Para todos: - Hemograma, AST/TGO e ALT/TGP Periodicidade: Trimestral Para Ciclosporina: - Creatinina, uréia, sódio, potássio, ácido úrico, triglicerídeos, colesterol total e HDL. Periodicidade: Trimestral.	H15.0 H20.1 H30.1 H30.2 H30.8 Oftalmologista (Preferencialmente) Recomenda-se que o tratamento da uveíte seja realizado em serviços especializados. PCDT
VASCULITE ASSOCIADA AOS ANTICORPOS ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS (PROTOCOLO MS) Rituximabe 500mg F/A – injet. (acima de 18 anos) Documentação para abertura	- Relato médico detalhado contendo: - o Descrição dos critérios diagnósticos que confirmam granulomatose com poliangiite (GPA) ou poliangiite microscópica (MPA); - o Indicação do estágio atual da doença, especificando se o uso do medicamento se destina à terapia de indução ou ao tratamento de recidiva; - o Caracterização da gravidade das manifestações clínicas, com detalhamento dos órgãos e/ou sistemas acometidos. - o Descrição do tratamento medicamentoso prévio e, quando aplicável, informação de refratariedade à ciclofosfamida - Exames: - o Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, gamaGT (validade 3 meses). - o Se comprometimento renal: EAS e proteinúria de 24 horas; ou relação proteína/creatinina em amostra isolada de urina (validade 3 meses). - o PPD ou IGRA (validade 1 ano); - o Laudo de Raio X de tórax (validade 1 ano);	Este Protocolo não contempla o tratamento de manutenção. Todavia, nos casos em que houver recidiva da doença, deverá ser apresentado: - Relato médico descrevendo a gravidade das manifestações clínicas e refratariedade à ciclofosfamida. Periodicidade: antecedência mínima de 20 dias úteis em relação à data prevista para a administração. - Hemograma, AST/TGO, ALT/TGP, gamaGT Periodicidade: antecedência mínima de 20 dias úteis em relação à data prevista para a administração. - EAS e proteinúria de 24 horas; ou relação proteína/creatinina em amostra isolada de urina Periodicidade: antecedência mínima de 20 dias úteis em relação à data prevista para a administração.	M31.3 M31.7 PCDT

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



	○ HBSAg; Anti-HBC; Anti-HBs; Anti-HCV; Anti-HIV (validade 1 ano); ○ Creatinina (validade 3 meses). ○ Beta HCG (validade 30 dias) ou documento médico que ateste a esterilização (sem validade) em mulheres em idade fértil. ○ Se houver, laudo histopatológico confirmando o diagnóstico		
--	--	--	--

RELAÇÃO DE SITUAÇÕES CLÍNICAS (E SEUS RESPECTIVOS MEDICAMENTOS) QUE AINDA NÃO POSSUEM PROTOCOLO CLÍNICO

SITUAÇÃO CLÍNICA Medicamentos	ABERTURA PROCESSO (1ª vez)	MONITORIZAÇÃO (Renovação de Exames)	CID-10 Médico Especialista
TRANSPLANTE DE CORÇÃO E PULMÃO Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) *Atualizado em 29/12/2025	LME, Receita Médica e Documentos Pessoais.	LME e Receita Médica - Trimestral	Z94.3 Z94.2
TRANSPLANTE DE MEDULA OU PÂNCREAS Alfaepoetina 1.000 UI, 2.000 UI, 3.000 UI, 4.000UI e 10.000UI injetável (por frasco-ampola) Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclosporina 25mg, 50mg e 100mg cáps Ciclosporina 100mg/mL sol. Oral (frasco de 50 ml) Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) *Atualizado em 29/12/2025	LME, Receita Médica e Documentos Pessoais.	LME e Receita Médica - Trimestral	Z94.8

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



OUTRAS IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	LME, Receita Médica e Documentos Pessoais.	LME e Receita Médica - Trimestral	D81.0 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular D81.1 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B D81.2 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B D81.3 Deficiência de adenosinadeaminase [ADA] D81.4 Síndrome de nezelof D81.5 Deficiência de purinanucleosídeo fosforilase [pnp] D81.6 Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade D81.7 Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade D81.8 Outras deficiências imunitárias combinadas D82.0 Síndrome de Wiskott-Aldrich D82.1 Síndrome de di George
---	---	--	--

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS:

SITUAÇÃO CLÍNICA Fórmulas Nutricionais	ABERTURA PROCESSO (1ª vez)	MONITORIZAÇÃO (Renovação de Exames)	CID-10 Profissional Especialista
--	--------------------------------------	---	---

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026



Fórmulas Infantis para Necessidades Dietoterápicas Especiais F2 – Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas à base de proteína extensamente hidrolisada do soro do leite com restrição de lactose. F3 – Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas à base de aminoácidos livres com restrição de lactose.	- LFN - Laudo para Solicitação de Fórmulas Nutricionais - ANEXO A¹. - Termo de Esclarecimento e Responsabilidade para uso de Fórmulas Nutricionais - ANEXO B. - Para maiores 6 meses - Plano alimentar⁴. - Curvas de crescimento com no mínimo 2 registros - Para crianças menores de 6 meses – Formulário de informações sobre a amamentação emitido por Banco de Leite Humano ou local referenciado pela SESA². - Formulário de abertura de processos de fórmulas infantis – ANEXO C.	- LFN - Laudo para Solicitação de Fórmulas Nutricionais - ANEXO A¹. Trimestral - Para maiores 6 meses - Plano alimentar⁴ - Trimestral - Curvas de crescimento com no mínimo 2 registros. - Trimestral	L50.0 L58.8 T78.1 H13.2 J20 T78.0 K23.8 K52.2 L27.2 K52.2 R63.8 Pediatra, outras especialidades em pediatria e nutricionista Profissional de Saúde do Banco de Leite Humano ou de local referenciado pela SESA. Médico: Pediatra e outras especialidades em pediatria (Gastropediatra, Alergologista pediatria, Neonatologista, etc).
--	--	--	--

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026

Fórmulas Pediátricas para Nutrição Enteral P1 – Fórmula pediátrica para nutricional enteral nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, sem adição de lactose e isento de glúten. P7 – Fórmula pediátrica para nutrição enteral à base de aminoácidos livres com restrição de lactose. P8 – Fórmula pediátrica para nutrição enteral à base de proteína hidrolisada do soro do leite com restrição de lactose.	- LFN - Laudo para Solicitação de Fórmulas Nutricionais - ANEXO A¹. - Termo de Esclarecimento e Responsabilidade para uso de Fórmulas Nutricionais - ANEXO B. - Curva de crescimento (Peso para Idade/ Comprimento por idade). - Laudo Médico com CID padronizado em portaria e com CID da doença de base³.	- LFN - Laudo para Solicitação de Fórmulas Nutricionais - ANEXO A¹. – Trimestral - Curva de crescimento (Peso para Idade/ Comprimento por idade). – Trimestral - Laudo Médico com CID padronizado em portaria e com CID da doença de base³ - Semestral	Z93.1 Z93.2 Z93.4 Pediatra, outras especialidades em pediatria e nutricionista Médico: Pediatra e outras especialidades em pediatria (Gastropediatra, Alergologista pediatra, Neonatologista, etc).
Fórmulas para Nutrição Enteral A1 – Fórmula para nutrição enteral nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, polimérica, sem adição de lactose, isento de glúten, fonte de proteína a base de caseinato. A2 – Fórmula para nutrição enteral nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, polimérica, isenta de sacarose, lactose e glúten, fonte de proteína a base de soja.	- Laudo Médico CID padronizado em portaria e da com CID da doença de base³. - LFN - Laudo para Solicitação de Fórmulas Nutricionais - ANEXO A¹. - Termo de Esclarecimento e Responsabilidade para uso de Fórmulas Nutricionais - ANEXO B. - Para pacientes de 10 a 19 anos - Curva de crescimento (Peso para Idade/ Comprimento por idade/IMC por idade).	- Laudo Médico CID padronizado em portaria e da com CID da doença de base³. – Semestral - LFN - Laudo para Solicitação de Fórmulas Nutricionais - ANEXO A¹. – Trimestral - Para pacientes de 10 a 19 anos - Curva de crescimento (Peso para Idade/ Comprimento por idade/IMC por idade). - Trimestral	Z93.1 Z93.2 Z93.4 Médico Nutricionista/Médico Nutrólogo Médico ou Nutricionista

NOTA: Todos os exames de imagem necessários para a abertura de processos, bem como para a monitorização, devem estar obrigatoriamente acompanhados de Laudo.

ATUALIZADO EM 06/10/2026